

**FARMACI SALVAVITA DI USO RARO - QUANTITATIVI MINIMI CHE DEVONO ESSERE SEMPRE PRESENTI SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL COORDINATORE INFERMIERISTICO**

**ATTENZIONE!** SI RICORDA CHE I FARMACI EMODERIVATI E NON, DISPONIBILI A MAGAZZINO PRESSO LA SEDE DI DISTRIBUZIONE INTERNA (GUM O FARMACIA), DEVONO ESSERE RICHIESTI SEMPRE PRESSO TALE SEDE IN ORARIO DI APERTURA DELLA STESSA, TRANNE CHE IN CASO DI NON DISPONIBILITA' O DI URGENZA EFFETTIVA, ONDE EVITARE CHE IL CENTRO DI STOCCAGGIO DI EMERGENZA POSSA RISCHIARE DI RIMANERNE SPROVVISTO.

**SI RACCOMANDA AI REPARTI O SERVIZI INTERESSATI DI STAMPARE UNA COPIA AGGIORNATA E TENERLA BENE IN VISTA A DISPOSIZIONE IN CASO DI EMERGENZA, INSIEME A QUELLA DEGLI ANTIDOTI**

AGGRASTAT 250 MCG/ML-50 ML-2 FLACONI in CARDIOLOGIA / SIMDAX 2,5 MG/ML - 5 ML UN FLACONE in RIANIMAZIONE / UROCHINASI: 20 FLACONI in DIALISI // ATTENZIONE I DEA E I PPI (Punti di Primo Intervento cioè il Pronto Soccorso Ovada) DEVONO AVERE PER l'IMA: TICAGRELOR 90 MG (BRILIQUE) - CLOPIDOGREL 75 MG - PRASUGREL 10 MG (EFIENT)

ATC	Descriz ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE	Scorta presso Riattivazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Riattivazione	Scorta presso Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Riattivazione	Scorta presso Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Riattivazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso Farmacia	
				NOVI LIGURE	OVADA				ACQUI TERME				TORTONA				CASALE M.			
B01	ANTITROMBOTICI																			
B01AD02	ALTEPLASI	ACTILYSE ev 1 flac. liof. 50 mg	Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.	4 fl				4 F.				4 F.					4 F			
B01AB02	ANTITROMBINA III	AT III KEDRION 1000 UI	AT III KEDRION: Conservare in frigorifero (da +2°C a +8°C). Non congelare. Tenere il flaconcino nell'imballaggio esterno, per proteggere il medicinale dalla luce.	9000 U				5000 U				5000 U					5000 U		9	
B02	ANTIEMORRAGICI																			
B02BD01	COMPLESSO PROTROMBINICO	KEDCOM (UMAN COMPLEX DI) 500 UI EV : contiene solo 3 fattori della coagulazione (IX, II, X)	KEDCOM (UMAN COMPLEX) Conservare in frigorifero (da +2 °C a +8 °C). Tenere il flaconcino nell'imballaggio esterno, per proteggere il medicinale dalla luce. Non congelare.	2500 U				2500 U				2500 U					2500 U			
B02BD01	FATTORE IX, II, VII E X DI COAGULAZIONE IN ASSOCIAZIONE	CONFIDEX 1000 U'FL POLV+FL 40ML: contiene 4 fattori della coagulazione (IX, II, VII, X)	CONFIDEX Non conservare a temperatura superiore a 25°C. Non congelare. Tenere il flaconcino nella scatola esterna per proteggerlo dalla luce.	5000 UI				5000 UI				5000 UI					5000 UI			
B02BD02	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO	KLOTT (EMOCLOT) 1000 U	KLOTT (EMOCLOT) Conservare in frigorifero (da +2 °C a +8 °C). Non congelare. Tenere il flaconcino nell'imballaggio esterno, per proteggere il medicinale dalla luce	6000 U				6000 U				6000 U					6000 U			
B02BD02	FATTORE VIII e Von Willebrand	HAEMATE P 1000 UI - 1000 UI del fattore VIII umano della coagulazione (FVIII) e 2400 UI del fattore von Willebrand umano (VWF)	HAEMATE P Haemate P 500/1000 non deve essere conservato ad una temperatura superiore a +25°C. Non congelare. Conservare il contenuto nella confezione.	8000 U				8000 U				8000 U					8000 U			
B02BD03	INIBITORE BYPASSANTE L'ATTIVITA' DEL FATTORE VIII	FEIBA FL 1000UF+BAXJECT II HF - COMPLESSO PROTROMBINICO ANTIEMFILICO UMANO ATTIVA	FEIBA FL Conservare a temperatura inferiore a 25°C. Non congelare. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.	2000 U													2000 U			



ATC	Descriz. ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE	Score presso Rinnalzazione	Score presso Neurologia	Score presso Blocco Operatorio	Score presso DEA	Score presso PS	Score presso Rinnalzazione	Score presso Blocco Operatorio (UNICO)	Score presso DEA	Score presso Farmacia	Score presso Rinnalzazione	Score presso Bloccchi Operatori (BLOCCO del Primo Piano e BLOCCO del Secondo Piano)	Score presso DEA	Score presso Farmacia	Score presso Rinnalzazione	Score presso Neurologia	Score presso Blocco Operatorio (BLOCCO del cui lato per Ostetricia Ginecologia)	Score presso DEA	Score presso Farmacia
			NOVI LIGURE	OVADA	ACQUI TERME	TORTONA	CASALE M.													
C01C	STIMOLANTI CARDIACI																			
C01CA04	DOPAMINA	DOPAMINA HOSPIRA (ex REVIVAN) 200 MG - 5 ML F. - ATTENZIONE: I NOMI DEI FARMACI GENERICI DOPAMINA E DOBUTAMINA SONO FACILMENTE CONFONDIBILI: OCCORRE METTERE IN ATTO STRATEGIE PER EVITARE IL CONFONDIMENTO TRA DOPAMINA E DOBUTAMINA // DOPAMINA HOSPIRA Conservare a temperatura non superiore ai 25°C e nella confezione originale				SI	SI		SI	10 f			SI	10 f					SI	10 f
C01CA07	DOBUTAMINA	MIOZAC (DOBUTREX) 250 MG./ML.20 EV. F. - ATTENZIONE: I NOMI DEI FARMACI GENERICI DOPAMINA E DOBUTAMINA SONO FACILMENTE CONFONDIBILI: OCCORRE METTERE IN ATTO STRATEGIE PER EVITARE IL CONFONDIMENTO TRA DOPAMINA E DOBUTAMINA - MIOZAC Conservare ad una temperatura inferiore a 25°C e al riparo dalla luce.				SI	SI		SI	10 f			SI	10 f					SI	10 f
C01CA19	FENOLDOPAM (MESILATO)	CORLOPAM mg.20 CORLOPAM Conservare ad una temperatura non superiore a 25°C al riparo dalla luce.	3 fiale													10				
H01	VASOPRESSINA, ANALOGHI																			
H01BA04	TERLIPRESSINA (ACETATO IDRATO)	VARIQUEL (Glipressina) 1 mg) EV.F. GLIPRESSINA Conservare a temperatura non superiore a 25°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce				5 f				5 f.				5 f.		5 fiale				
H03AA	ORMONI TIROIDEI																			
H03AA01	LEVOTIROXINA	L-TYROXIN II 0.2 MG (farmaco di importazione dall'estero) L-TYROXINE Vedere sulla confezione o nel foglietto illustrativo										12 F (2 scatole da 6 fiale)								
J01	ANTIBATTERICI																			
J01DD52	CEFTAZIDIMA + AVIBACTAM	ZAVICEFTA 2000 MG/500 MG ZAVICEFTA La specialità non ha una temperatura particolare di conservazione. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.	9 FL						9 FL			9 FL				9 FL				
J01DH52	MEROPENEM + VABORBACTAM	VABOREM 1G/1G VABOREM Non conservare a temperatura superiore a 25°C	18 FL						18 FL			18 FL				18 FL				
J01DI01	CEFTOBIPROLO MEDOCARIL	MABELIO 500 MG MABELIO Conservare in frigorifero (2-8°C) e nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce	9 FL						9 FL			9 FL				9 FL				
J01DI04	CEFIDEROCOL	FETCROJA 1 G FETCROJA Conservare in frigorifero (2-8°C) e nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce	18 FL						18 FL			18 FL				18 FL				
J01DI54	CEFTOLOZANO + TAZOBACTAM	ZERBAXA 1G/0,5G ZERBAXA Conservare in frigorifero (2-8°C) e nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce	18 FL						18 FL			18 FL				18 FL				
ANTIBATTERICI PER PROFILASSI ANTI-MENINGITE DA MENINGOCOCCO																				
J01MA02	CIPROFLOXACINA	CIPROXIN MG.500 CP CIPROXIN La specialità non ha una temperatura particolare di conservazione				2 confezioni	2 confezioni			2 confezioni				2 confezioni					2 confezioni	
J04AB02	RIFAMPICINA	RIFADIN MG.300 CP RIFADIN La specialità non ha una temperatura particolare di conservazione				10 confezioni	10 confezioni			10 confezioni				10 confezioni					10 confezioni	

ATC	Descriz ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE	NOVI LIGURE				OVADA	ACQUI TERME				TORTONA				CASALE M.				
			Scorta presso Ramificazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Blocco Operatorio	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Ramificazione	Scorta presso Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Ramificazione	Scorta presso Blocco Operatorio (BLOCCO del Primo Piano e BLOCCO del Secondo Piano)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Ramificazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Clinica Blecc.2 (BLOCCO di cui uno per Ostetricia Clinico-ologia)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia
J04AB02	RIFAMPICINA	RIFADIN 20 mg/ml sciroppo flacone 60 ml				3 fl	2 fl			3 fl			3 fl						3 fl	
J01X	ALTRI ANTIBATTERICI																			
J01XX09	DAPTOMICINA	CUBICIN 500 MG E CUBICIN 350 MG	conservare in frigorifero tra +2°C e +8°C	3 FL + 3 FL				3 FL + 3 FL				3 FL + 3 FL						3 FL + 3 FL		
J02	ANTIMICOTICI PER USO SISTEMICO																			
J02AA01	AMFOTERICINA B Liposomiale	AMBISOME 50 MG F EV	AMBISOME Conservare a temperatura non superiore ai 25°C i flaconcini sigillati di polvere liofilizzata	21 FL				21 FL				21 FL						21 FL		
J02AA01	ANIDULAFUNGINA	ECALTA 100 mg polv. e 30 ml solv. per conc. per soluz. per inf. uso ev	ECALTA Conservare in frigorifero (2°C-8°C)	4 FL				4 FL				4 FL						4 FL		
J02AC03	VORICONAZOLO	VFEND MG.200 F.EV	Non ci sono particolari indicazioni di temperatura	8 FL				8 FL				8 FL						8 FL		
J06	IMMUNOGLOBULI-LINE																			
J06BA02	IMMUNOGLOBULINE, UMANE NORMALI, PER USO ENDOVENOSO	IG EV 5 G. ML.100 (es. Vental, Igvna, Fiebogamma)	IG EV Conservare in frigorifero (2°C - +8°C). Tenere il flacone nell'imballaggio esterno.	5				5				5						5		
J06BB04	IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIEPATITE INTRAMUSC CIRCA 500 UI	IGANTIBE 600 UI - IMMUNOHS 540 UI - UMAN BIG 540 UI	SPECIALITA' DIVERSE: vedere sulla confezione della specialità aggiudicata			4				4				4					4	
M03	MIORLASSANTI																			
M03CA01	DANTROLENE	DANTRIUM MG.20 polv per infus	DANTRIUM Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Il contenuto del flaconcino deve essere protetto dalla luce diretta e impiegato entro 6 ore dalla preparazione. La soluzione non deve essere esposta a temperature inferiori a 15°C e superiori a 25°C.																	
	segue																			

vedi Tabella Antidoti



ATC	Descriz ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE	Scorta presso Rinnalzazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Blocco Operatorio	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Rinnalzazione	Scorta presso Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rinnalzazione	Scorta presso Blocci Operatori (BLOCCO del Primo Piano e BLOCCO del Secondo Piano)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rinnalzazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Blocco Operatorio (2 BLOCCHI di cui uno per Ostetricia-Ginecologia)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	
FARMACI D'EMERGENZA IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA			NOVI LIGURE	OVADA	ACQUI TERME	TORTONA	CASALE M.														
H01BB02	Oxotocina	SYNTOCINON SUI/MIL SOLIN.6F (4 CONFEZIONI)	SYNTOCINON Conservare in frigorifero (2-8°C). Conservare nella confezione originale per proteggere il prodotto dalla luce.				24 F			24 F											
G02AB01	Metilergometrina	METHERGIN IM IV 6F 1ML 0.2MG/M (UNA CONFEZIONE)	METHERGIN Conservare tra 2°C e 8°C. Non congelare. Tenere le fiale nell'imballaggio esterno per proteggerle dalla luce. Le fiale possono essere conservate per 2 settimane fuori dal frigorifero, ma a temperature non superiori a 25°C.				6 F			6 F											
G02AD05	Sulprostone	NALADOR INIET 1F 0,5MG 2ML (12 FIALE)	NALADOR Conservare in frigorifero (2°- 8°C). Il prodotto può essere conservato a temperature superiori, purché non oltre i 25°C, per un periodo massimo di 8 giorni.				12 F			12 F											
G02CA01	Ritodrina	MIOLENE-50-mg/5-ml- soluzione-per- infusione(UNA- CONFEZIONE)	MIOLENE Nessuna speciale- precauzione-per-la-conservazione				UNA- CONFEZIONE-E			UNA- CONFEZIONE											
CESSATA COMMERCIALIZZAZIONE																					
G02CA49	Isossuprina cloridrato	VASOSUPRINA ILFI 10 mg/2 ml SOLUZIONE INIETTABILE (2 CONFEZIONI)	VASOSUPRINA Conservare in normali condizioni ambientali				DUE CONFEZIONI			DUE CONFEZIONI											
G02CX01	Atosiban	TRACTOCILE 37,5 mg di atosiban (sotto forma di acetato)	Conservare in frigorifero (2°C - 8°C). Conservare nella confezione originale per proteggerlo dalla luce.				UNA CONFEZIONE E			DUE CONFEZIONI											
G02CX01	Atosiban	TRACTOCILE 6,75 mg di atosiban (sotto forma di acetato)	Conservare in frigorifero (2°C - 8°C). Conservare nella confezione originale per proteggerlo dalla luce.				UNA CONFEZIONE E			DUE CONFEZIONI											

I reparti di Ostetricia e Ginecologia devono obbligatoriamente avere i seguenti farmaci in quantità congrua. Nei Presidi Ospedalieri ove non è presente il Reparto di Ostetricia e Ginecologia gli stessi farmaci devono essere presenti presso i DEAPPS e gli stessi, se inutilizzati, a 6 mesi dalla scadenza, dovrebbero essere inviati ai reparti di Ostetricia-Ginecologia e scambiati con confezioni di recente acquisto e con validità lunga, evitando così di ricomprarli alla scadenza.