

	<p style="text-align: center;"><b>Procedura Generale Aziendale PG DSRI ASL AL 007</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Gestione dei casi sospetti ed accertati di Tubercolosi nei Presidi Sanitari ASL AL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Mod. PG DSRI ASL AL 007/01</b></p>
---	--	--

**VALUTAZIONE DEL PAZIENTE FINALIZZATA  
ALLA DEFINIZIONE DEL SOSPETTO DI TUBERCOLOSI POLMONARE**

**1) VALUTAZIONE RISCHIO TB AL TRIAGE**

**Se tosse persistente da almeno 15 giorni** associata ad almeno **uno dei seguenti sintomi:**

1. emoftoe
2. febbre associata a:
  - altra sintomatologia respiratoria
  - calo ponderale (> del 10% del peso ideale in meno di tre mesi)
  - sudorazione notturna
  - astenia intensa
  - toracoalgia
  - abbondante espettorazione



**Mascherina chirurgica al pz; isolamento pz in stanza singola; avviso agli altri operatori per utilizzo DPI**

**2) VALUTAZIONE RISCHIO TB DURANTE VISITA MEDICA**

**Valutare i seguenti fattori di rischio o l'appartenenza a gruppi a rischio:**

- immigrati da paesi a prevalenza medio/alta di TB<sup>(1)</sup> nei primi 5 anni di soggiorno in Italia
- soggetti senza fissa dimora, carcerati, HIV+, tossicodipendenti per via e.v. e abuso di cocaina per via endonasale, alcolisti;
- anziani immuno-deficienti, immuno-compromessi naturali o iatrogeni;
- impiegati in comunità ad alto rischio (prigioni, case d'accoglienza per senzatetto ecc)
- recenti contatti di casi contagiosi di TB
- patologie associate (diabete, immunocompromissione, silicosi, leucemie, linfomi, IRC, carcinoma testa/collo/polmone, gastrectomia o by-pass digiuno ileale, malnutrizione, ecc)

<sup>(1)</sup> Per l'individuazione dei paesi a prevalenza medio/alta di TB fare riferimento al sito dell'OMS: [TB profile \(shinyapps.io\)](http://shinyapps.io/tbprofile/)

**3) VALUTAZIONE FINALE**

Se l'utente riferisce **oltre la tosse** almeno uno dei segni/sintomi indicati e un fattore di rischio associato



**ISOLAMENTO RESPIRATORIO STRETTO e avvio accertamenti**