

	<b>Procedura Generale Aziendale PG DSRI ASL AL 007 Gestione dei casi sospetti ed accertati di Tubercolosi nei Presidi Sanitari ASL AL</b>	<b>Mod. PG DSRI ASL AL 007/06</b>
---	---	---

## MODULO INFORMATIVO PER I CONTATTI RICOVERATI

**Gentile Signore/a,**

In concomitanza del Suo ricovero in ospedale, è stata rilevata la presenza in reparto di un malato affetto da tubercolosi polmonare. Per escludere che tale evento, del tutto accidentale e purtroppo non prevedibile, possa essere stato fonte di contagio con il micobatterio tubercolare, è necessario:

- 1) eseguire subito il test su sangue (test basale - Quantiferon), che valuta l'eventuale infezione tubercolare.
  - L'esito positivo indica che Lei, nel corso della sua vita, è già venuto a contatto con il bacillo tubercolare ed ha sviluppato una risposta immunitaria specifica.
  - In caso invece di esito negativo del test basale, sarà necessario eseguire un secondo test a distanza di 8 – 10 settimane.
- 2) eseguire una radiografia del torace , se non già effettuato recentemente, per escludere lesioni tubercolari non note.

Successivamente è opportuno che nei 3-4 mesi successivi al ricovero Lei controlli il suo stato di salute, in particolare se compaiono tosse secca, stanchezza, febbre, dimagrimento.

In caso di positività, La preghiamo di contattare il suo Medico curante che provvederà ad approfondire il quadro clinico ed a fornire indicazioni per un ulteriore trattamento.

Per qualsiasi problema contattare il proprio medico curante.

**Data:**.....

**Firma paziente:**.....