


ANTIDOTI ASL AL								Fonte: CAV Pavia Antidoti 2016-2017 tranne dove indicato RER (Centro Regionale Antidoti Regione Emilia Romagna)			
LE STRUTTURE DI STOCCAGGIO INDICATE SONO RESPONSABILI DEL MANTENIMENTO E DEL RINNOVO DELLE SCORTE CONCORDATE. SI RACCOMANDA DI CONTROLLARE LE SCADENZE MENSILMENTE. LE QUANTITA' INDICATE SONO QUELLE MINIME DA TENERE IN DOTAZIONE											
SI RACCOMANDA AI REPARTI O SERVIZI INTERESSATI DI STAMPARE UNA COPIA AGGIORNATA E TENERLA BENE IN VISTA A DISPOSIZIONE IN CASO DI EMERGENZA, INSIEME A QUELLA DEI "SALVAVITA"											
NELLE ULTIME 4 PAGINE SONO INDICATI GLI ANTIDOTI CON INDICAZIONI, QUANTITA' MINIME E FARMACI PER EMERGENZA TERRORISMO											
CAV=CENTRO ANTIVELENI DI PAVIA		GLI ANTIDOTI DI PRIORITA' UNO DEVONO ESSERE PRESENTI SIA NEI DEA / PRONTO SOCCORSO di Acqui T, Casale M., Novi L., Tortona CHE NEL PPI o Punto di Primo Intervento di Ovada)				Centro AntiveleNI di Pavia via Salvatore Maugeri 10, 27100 Pavia					
						IL NUMERO ATTIVO PER LE EMERGENZE è 0382 24444					
PRINCIPIO ATTIVO	FRIGO: TC (tem-peratura di conser-vazione)	PRIORITA' secondo Regolamento CEE 3086/1986	NOME COMMERCIALE	DEA / PS: ACQUI T.- CASALE M. - NOVI L. - TORTONA	Punto di Primo Intervento: OVADA	GUM TORTONA, FARMACIA ACQUI, FARMACIA CASALE	RIANIMA-ZIONE	SALA OPERATORIA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO / Intossicazione da -	Quantitativi presenti obbligatoriamente nel sito di stoccaggio (escluso farmacia)	Emerg-terrorism o
ACIDO FOLICO - ACIDO FOLINICO - CALCIO LEVOFOLINATO		2	PREFOLIC'IM IV 6 FL 50MG+6 F (equivalente a 50 mg di acido folico e a mg 25 di acido levofolico)	NOVI (10 fiale) - CASALE (10 fiale)	NO	SI	NO		Intossicazione da antagonisti dell'acido folico come metotrexate, trimetoprim, pirimetamina. Utilizzato anche nell'intossicazione da metanolo. (fonte: RER)	10 fiale solo NOVI - CASALE	
ALCOL ETILICO O ETANOLO (Alcool etilico sterile 95% fl)		1	ETANOLO STER. 95% ML.10 FIALE - FORNITE CON ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' DA PARTE DEL MEDICO RICHIEDENTE, NON ESSENDO REGISTRATE IN ITALIA	SI	SI	SI	NO		Alcoli, glicoli: es. glicole gilenico, metanolo	60-80 f.	
AMIDO di frumento, di riso o di mais o di fecola di patate		1		SI	SI	SI	NO		Iodio	500 g.	
FRAMMENTI ANTICORPALLI ANTIVIPERA // SIERO ANTIVIPERA - ATTENZIONE: PERICOLO in caso di ALLERGIA, possibile SHOCK ANAFILATTICO: RIVOLGERSI SEMPRE PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE AL CENTRO ANTIVELENI	Conservare nella sua scatola alla T indicata sulla confezione	2		2 fiale al DEA di Novi Ligure.					morso da vipera europea: l'uso è più appropriato in caso di forte intossicazione	2 fiale al DEA di Novi Ligure: la seconda fiala serve solo successivamente, se se ne richiede l'uso.	
ATROPINA FIALE		1	Atropina 0,5 mg fl.	SI	SI	SI	SI		Avvelenamento da esteri organofosforici e carbammati (sindrome colinergica). Avvelenamento da Amanita muscaria o da parasimpaticomimetici (muscarina, betanecolo, carbacolo). Controllo della bradicardia nell'avvelenamento da digitale e beta-bloccanti (fonte: RER)	100 fiale	si
CALCIO EDETATO BISODICO G.1 ML.10, DA DILUIRE		3 (era di priorità 2)	Calcio Bisodico Edetato 10% fl, diluire in soluzione fisiologica 0,9% o glucosata 5% 500 ml	NOVI	NO	NO	NO		piombo (cadmio, rame, zinco, manganese, alcuni radioisotopi)	20 fiale	
CALCIO GLUCONATO		1	Calcio gluconato 10% 10 ml fl da diluire	SI	SI	SI	SI		IPOCALCEMIE per ingestione di fluoruri e ossalati (es. antruggine) - contatto cutaneo con fluoruri e ossalati (es. antruggine). POTASSIO (VEDI NOTA IN BASSO PER IPERPOTASSIEMIA)	almeno 10 fiale per DEA o PPI - DEVONO AVERLO TUTTI I REPARTI E AMBULATORI CHE UTILIZZANO IL POTASSIO CONCENTRATO	si
CALCIUM GEL		2	Calcium gel (galenico) 250 ml tub: a base di Calcio Gluconato 2,5% + Lidocaina 2% è disponibile su richiesta presso il CAV di Pavia	CAV	NO	NO			Ac fluoridrico, contatto cutaneo con ac. fluoridrico	CAV	
CARBONE VEGETALE ATTIVATO IN POLVERE		1	Carbone attivato polvere (Carbomix gr. 50 granuli NON disponibile)	SI	SI	SI			adsorbente aspecifico	Carbone attivato 10 confezioni da g.50 (totale 500 g) - NON DISPONIBILE: 10 fl. Carbomix os granulato per sospensione 50 g	
CARTINE DI TORNASOLE (range pH 1-14)		1		SI	SI				per determinazione in urgenza delle soluzioni presunte caustiche/corrosive	N.1 confezione	
CIPROEPTADINA SCIROPPPO		2	Periactin	SI	NO				Sindrome serotoninica	N.1 per DEA	
COLESTIRAMINA		3	Questran 4 g 12 buste per os	SI	SI	SI			digitossina	1 conf.	

PRINCIPIO ATTIVO	FRIGO: TC (temperatura di conservazione)	PRIORITA' secondo Regolamento CEE 3 dic 1980	NOME COMMERCIALE	DEA / PS: ACQUI T. - CASALE M. - NOVI L. - TORTONA	Punto di Primo Intervento: OVADA	GUM TORTONA, FARMACIA ACQUI, FARMACIA CASALE	RIANIMAZIONE	SALA OPERATORIA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO / intossicazione da -	Quantitativi presenti obbligatoriamente nel sito di stoccaggio (escluso farmacia)	Emerg. terrorism o
DANTROLENE	Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.	1, 2	Dantrium 20 mg fl	NO	NO	NO	36 fiale a Casale M	36 fiale sia ad Acqui T., sia a Novi L. che a Tortona	ipertermia maligna (priorità 1), sindrome maligna da neurolettici (priorità 2)	36 fl.	
DEFEROXAMINA	T. infer. a + 25°C	3	Desferal 500 mg flic	NOVI (10 FIALE) - CASALE (10 FIALE)	SI	SI			ferro, alluminio	10 fiale	
DIAZEPAM		1	Diazepam 10 mg fiale	SI	SI	SI			clorochina (anticonvulsivante)	30 fiale	SI
DISULFIRAM		3	Etiltox mg.200 cp o Antabuse dispergettes mg.400 (24 cpr efferv.)	NOVI - CASALE	SI	SI			Nickel	2 conf. di Etiltox mg.200 oppure 1 confezione di Antabuse mg.400 sia A CASALE che a NOVI	
FAB ANTIDIGITALE antidigossina	T.C. da +2 a +8°C	1	Digifab mg.40 FARMACO ESTERO	2 F	1 F.				Digossina, glucosidi simil-digitalici	2f per DEA e 1 f per PPI	
FISOSTIGMINA SALICILATO (ESERINA)		1	Anticholium 2 mg fl - FARMACO ESTERO	SI	SI	SI			sindrome anticolinergica centrale (atropina e anticolinergici)	5 fiale da mg.2	SI
FLUMAZENIL	T.C.infer. a +30°C	1	Anexate 0,5 mg fl	SI	SI	SI			benzodiazepine	20 f. da 0,5 mg.	
GLUCAGONE	T.C. da +2 a +8 °C	1	Glucagen 1 mg fl	3 fiale	30 fiale - non kit	3 fiale	30 fiale no kit: per un avvelenamento da betabloccanti la quantità minima è di 100 fiale per cui vanno recuperate le fiale delle altre Rianimazioni ASL		Betabloccanti, Calcioantagonisti, (insulina)	3 FIALE in ogni DEA, 30 nel PPI di Ovada e 30 fiale in ogni Rianimazione	
GLUCOSIO IPERTONICO		1	Glucosio 33% fl.10 ml.	SI	SI	SI			coma ipoglicemico	50 FIALE	
IDARUCIZUMAB	T.C.: +2°C - +8°C. Non congelare. Al riparo dalla luce	1	Praxbind 2,5 g/50 ml soluzione iniettabile per infusione uso ev 2 flaconcini 50 ml. VEDI NOTA (1)	SI (ACQUI, CASALE M, NOVI LIGURE, TORTONA)	SI (OVADA)	NO	NO	NO	Inattivatore specifico per dabigatran: Praxbind è un inattivatore specifico per dabigatran ed è indicato nei pazienti adulti trattati con Pradaxa (dabigatran etexilato) nei casi in cui si rende necessaria l'inattivazione rapida dei suoi effetti anticoagulanti: 1) Negli interventi chirurgici di emergenza/nelle procedure urgenti. 2) Nel sanguinamento potenzialmente fatale o non controllato.	1 CONFEZIONE contenente 2 flaconcini da 2,5 g/50 ml di soluzione iniettabile per infusione uso ev	NO
IDROSSICOBALAMINA	T. max +25°C	1	La CONFEZIONE è di un flac. di Cyano-kit 5 g.	2 CONFEZIONI	1 CONFEZIONE				cianuri	2 confezioni per DEA ASL AL e 1 confezione per PPI	SI
INSULINA SOLUBILE (AD ES. ACTRAPID) + SOLUZIONE GLUCOSIO AL 50% ml.500 in TUTTI I REPARTI E AMBULATORI CHE UTILIZZANO IL POTASSIO CONCENTRATO.			il glucosio al 50% va tenuto a parte, possibilmente insieme al Potassio, per non confonderlo con il glucosio a minore concentrazione!	SI	SI	SI	SI		POTASSIO (VEDI NOTA IN BASSO PER IPERPOTASSIEMIA)	1 FLAC. ACTRAPID + n.X FLAC GLUCOSIO 50 % in TUTTI I REPARTI E AMBULATORI CHE UTILIZZANO IL POTASSIO CONCENTRATO	
IPECACUANA	T. inferiore a +25°C	1	Ipecac Syrup (USP) 7% 30ml scir PRODOTTO ESTERO (Canada)	2 FL	2 FL				induzione dell'emesi	2 FL.	
LABELALOLO	vedi confezione	1	Labetalolo Salf (ex Trandate) mg.100 ml.20 f.ev con assunzione di responsabilità	5 fiale ad Acqui, Casale M. e Tortona	5 fiale	SI	Solo a Novi la Rianimazione stocca 40 f. e l'Ostetricia-Ginecologia 50 f.		alfa-adrenergici	5 FIALE	
MAGNESIO SOLFATO (MgSO4)		1	Magnesio solfato 30g polv. Bustine	SI	SI	SI			catartico		
MANNITOLE	tenere a temperatura ambiente perché a freddo cristallizza	1 (era di priorità 2)	MANNITOLE 18% ml.250 soluzione per infusione	SI	SI	SI			Intossicazione da ciguatera (cioè la ciguatera, che è la forma più comune di intossicazione da pesce) e grave tossicità da vitamina A	3-4 flac da 250 ml	
METILTIONINIO (BLU DI METILENE)		1	Blu di metilene 1% 100 mg fl. ml.10	SI	SI	SI			sostanze metaemoglobinizzanti oppure shock distributivo oppure neurotossicità da ifosfamide	10 FIALE	SI
N-ACETILCISTEINA		2	Hidonac 5 g flic.	10	5	SI	NO		PARACETAMOLO, funghi contenenti amanitina, solventi epatotossici, altri agenti epatotossici e ossidanti	10 f in ogni DEA, 5 f nel PPI di Ovada	SI
NALOXONE		1	Naloxone (Narcan) 0.4 mg fl	SI	SI	SI			oppioidi	15 FIALE	
NEOSTIGMINA		2	Intrastigmina mg 0,5 fl	SI	SI	SI			ileo paralitico e altri sintomi periferici da anticolinergici curari	10 FIALE	
NITROPRUSSIATO DI SODIO		1	Sodio nitroprussiato 100 mg fl	SI	SI	SI			ergotismo	10 FIALE	

PRINCIPIO ATTIVO	FRIGO: TC (temperatura di conservazione)	PRIORITA' secondo Rischio LCEE 3 del 1980	NOME COMMERCIALE	DEA / PS: ACQUI T. - CASALE M. - NOVI L. - TORTONA	Punto di Primo Intervento: OVADA	GUM TORTONA, FARMACIA ACQUI, FARMACIA CASALE	RIANIMAZIONE	SALA OPERATORIA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO / intossicazione da -	Quantitativi presenti obbligatoriamente nel sito di stoccaggio (escluso farmacia)	Emerg. terrorism o
OLIO DI VASELINA (PARAFFINA LIQUIDA) FU PER OS		1	flac ml.200	SI	SI	SI			antidoto aspecifico (antidoto universale delle sostanze liposolubili, in quanto non assorbito) - diluente solubilizzante gli idrocarburi, come emolliente e lassativo; per rimuovere il solfato di bario residuo dopo clistere di bario (fonte: RER).	2 FLAC	
MACROGOL (PEG) 4000 IN SOL. ELETTROLITICA		1	Moviprep polv. per soluz. orale in bustine 1 trattamento (attenzione: contiene acido ascorbico)	SI	SI	SI			catarsi / lavaggio intestinale	1 CONFEZIONE	
D-PENICILLAMINA (precedentem. Pemine) VEDI NOTA (2)		4	D-PENICILLAMINA mg.150 cps confezioni da 50 cps	OSPEDALE DI TORTONA - in ogni caso è disponibile presso CAV					Rame, morbo di Wilson, (mercurio, piombo, zinco, oro, arsenico, cadmio), cistinuria	5 conf.= 250 cps	
PRALIDOSSIMA		2	Contrathion 200 mg fl	20 FIALE poi CAV	SI	SI			esteri organofosforici (insetticidi)	20 FLAC IN OGNI PRESIDIO POI CAV	si
PROTAMINA CLORIDRATO		1	Protamina 50 mg fl	SI	SI	SI			eparina	5 FIALE	
SIERO ANTIBOTULINICO	vedere confezione	2	Occorre richiedere il siero antitotulinico presso il Ministero della Salute telefonando al Dr Virgilio Costanzo Cell. 335 6958216 e telefonando anche al Magazzino Centrale del Materiale Profilattico del Ministero della Salute 06-5994.2551 oppure 06 5994.2550 (attivi 24 ore su 24)	Ministero della Salute - Roma	Ministero della Salute - Roma				botulismo	disponibile presso CAV. e Ospedali Regionali	si
SIERO ANTIMALMIGNATTA	vedere confezione	3		CAV	CAV				vedova nera, morsi di ragni appartenenti al genere Latrodectus		
SIMETICONE		1	Mylicon gtt 30 ml	SI	SI	SI			sostanze schiumogene (antischiama)	5 conf.	
SODIO BICARBONATO 8,4% ML.100		1	Bicarbonato di sodio 8,4% flc	SI	SI	SI			alcalinizzazione di plasma e urine - cardiotossicità da farmaci (es.chinidina, antidepressivi triciclici) - aumento escrezione urinaria di alcuni farmaci (es.fenobarbitale, ac.acetilsalicilico)	25 FLAC	
Sodio polistirensulfonato VEDI NOTA (3)	Kayexalate		Kayexalate 100 mg/g polvere per sospensione orale flac. 454 g	SI	NO				per il trattamento di iperkaliemia ed iperfosfatemia	1 FLAC.	
SODIO TIOSOLFATO (IPOSOLFITO)		1	Sodio iposolfito 10% fl 10 ml	SI	SI	SI			ingestione di ipoclorito di sodio (candeggina classica, varechina) - cianuri - stravano di mecloretamina, oxaliplatino, cisplatino e carboplatino	50 fiale per una terapia	si
SUCCIMER	TC max +25°C	3		CAV	CAV				arsenico, lewisiti, mercurio, piombo	CAV	si
TERRA DI FULLER- LA TERRA DI FULLER PUO' ESSERE SOSTITUITA DAL CARBONE VEGETALE ATTIVATO. (FONTE: MARRUBINI, INTOSSICAZIONI ACUTE)		1	Terra di Fuller 30 g polv	QUESTO ANTIDOTO NON VIENE PIU' FORNITO DALLA DITTA: PRESENTE AD ACQUI, CASALE E NOVI FINO ALLA SCADENZA - REPERIBILE PRESSO CAV					paraquat (erbicida di contatto), diquat	30 flac. <u>Non In Vendita</u>	
Vitamina B1 (Tiamina)		2	Vitamina B1 mg.100/ml2	SI	SI				alcol etilico, glicol etilenico, ifosfamide	10 f da 200 mg	
VIT. B6 (Piridossina)		1	Piridossina (Benadon) 300 mg fl va acquistata all'estero perché non disponibile in Italia	SI	SI	SI			isoniazide, idrazina, monometil idrazina (funghi del genere gyromitra), glicole etilenico	60 fiale di piridossina da mg.300 (sentito il CAV PV)	
VITAMINA C (acido ascorbico)		2	Vitamina C Angelini 1 g/5 ml fl	SI	SI	SI			metaemoglobinemia	30 fiale	
VITAMINA K (fitomenadione)	T.max.25°C	1	Konakion 10 mg/ml soluz. orale e iniett. 3 fiale 1 ml	SI	SI	SI			Ipprotrombinemia conseguente ad intossicazione da salicilati; - reazione avversa da derivati cumarici e indandionici, evidenziata da un elevato tempo di protrombina; - deficit di vitamina k (malattia emorragica nel neonato, proflassi dell'emorragia del neonato, malnutrizione). . Fonte: RER	21 FIALE	
OSSIGENO		1							Monossido di carbonio (CO), cianuri, idrogeno solforato		

PRINCIPIO ATTIVO	FRIGO: TC (temperatura di conservazione)	PRIORITA' secondo Regolamento CEE 3 dir 1980	NOME COMMERCIALE	DEA / PS: ACQUI T. - CASALE M. - NOVI L. - TORTONA	Punto di Primo Intervento: OVADA	GUM TORTONA, FARMACIA ACQUI, FARMACIA CASALE	RIANIMAZIONE	SALA OPERATORIA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO / intossicazione da -	Quantitativi presenti obbligatoriamente nel sito di stoccaggio (escluso farmacia)	Emerg. terroristico
<p>TRATTAMENTO DI EMERGENZA DELL' IPERPOTASSIEMIA (IPERKALIEMIA) Il trattamento di emergenza è necessario se la concentrazione sierica di potassio è superiore a 6,5 mmol / L. - La procedura è la seguente: 1) Si deve somministrare 10 ml di calcio gluconato al 10% per via endovenosa per almeno due minuti per stabilizzare il muscolo cardiaco. Ripetere se necessario, in base all' ECG. 2) Abbassare rapidamente la potassiemia somministrando insulina solubile, ad esempio Actrapid in glucosio al 50 %. FONTE BIBL.: Longmore M, Wilkinson I. Rajagopalan S, eds. Oxford Handbook of Clinical Medicine, 6th edn. Oxford: Oxford University Press, 2004.</p>											
NOTE											
(1) PRAXBIND Attualmente il prodotto è classificato in CNN, cioè non ha un prezzo concordato con l'AIFA, tuttavia la Ditta fornitrice è tenuta a cambiarlo alla scadenza. In ogni caso si prega - due mesi prima della scadenza - di inviare fotocopia dei dati identificativi del prodotto cioè del fustello completo di targatura e del lotto/scadenza alla Farmacia di competenza per poter procedere alla richiesta di sostituzione con nuovo prodotto alla Ditta. Invece il farmaco, se utilizzato, dovrà essere scaricato su file F.											
(2) D-PENICILLAMINA (precedentem. Pemine): l'uso come antidoto nelle intossicazioni da piombo è, dal luglio 2011, ricompreso nell'elenco principale della legge 648/96 e pertanto quando lo dovesse usare, il clinico deve fare il monitoraggio clinico inviandone copia alla farmacia che effettua il monitoraggio economico trimestrale ad AIFA											
(3) Sodio polistirensulfonato (KAYEXALATE) 4.4- Avvertenze speciali e precauzioni di impiego - Alternative terapeutiche nell'iperpotassiemia grave: poiché per un efficace abbassamento del potassio sierico con KAYEXALATE possono essere necessarie ore o giorni, il trattamento con questo farmaco da solo può non bastare a correggere rapidamente una grave iperpotassiemia provocata da condizioni di rapida distruzione di tessuti, come esempio nelle ustioni e nell'insufficienza renale.											
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 20px;"> <p>FONDAZIONE MAUGERI: CENTRO ANTIVELENI CENTRO ANTIVELENI DI PAVIA via Salvatore Maugeri 10, 27100 Pavia</p> </div>  </div>											
<p>Classi di priorità di impiego degli antidoti</p> <p>Gli antidoti utili nel trattamento degli avvelenamenti acuti nell'uomo sono stati valutati per l'efficacia, la sicurezza e l'urgenza di impiego. Sono state distinte tre classi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>antidoti con priorità 1</i> = il farmaco deve essere disponibile entro 30 minuti (quindi presente in tutti i servizi di emergenza) • <i>antidoti con priorità 2</i> = il farmaco deve essere disponibile entro 2 ore (quindi può essere disponibile nelle farmacie ospedaliere - operative h24 o con reperibilità - oppure presso servizi clinici d'urgenza di ospedali di riferimento) • <i>antidoti con priorità 3</i> = il farmaco deve essere disponibile entro 6 ore (ospedali di riferimento regionale/sovraregionale, centri antiveneni), • <i>antidoti con priorità 4</i> = alcuni antidoti sono stati inseriti in una classe a parte perché la loro disponibilità può essere superiore alle 6 ore e/o può essere sufficiente a livello sovraregionale o in un unico centro a livello nazionale. 											