

ANTIDOTI ASL AL

LE STRUTTURE DI STOCCAGGIO INDICATE SONO RESPONSABILI DEL MANTENIMENTO E DEL RINNOVO DELLE SCORTE CONCORDATE. SI RACCOMANDA DI CONTROLLARE LE SCADENZE MENSILMENTE. LE QUANTITA' INDICATE SONO QUELLE MINIME DA TENERE IN DOTAZIONE

SI RACCOMANDA AI REPARTI O SERVIZI INTERESSATI DI STAMPARE UNA COPIA AGGIORNATA E TENERLA BENE IN VISTA A DISPOSIZIONE IN CASO DI EMERGENZA, INSIEME A QUELLA DEI "SALVAVITA"

NELLE ULTIME DUE PAGINE SONO INDICATI GLI ANTIDOTI CON INDICAZIONI, QUANTITA' MINIME E FARMACI PER EMERGENZA TERRORISMO

CAV=CENTRO ANTIVELENI DI PAVIA		GLI ANTIDOTI DI PRIORITA' UNO DEVONO ESSERE PRESENTI SIA NEI DEA (Pronto Soccorso Tortona - Novi L. - Acqui T. - Casale M.) CHE NEI Punti di Primo Intervento (PPI) (Pronto Soccorso Ovada)			Centro Antiveleni di Pavia via Salvatore Maugeri 10, 27100 Pavia				
PRINCIPIO ATTIVO		FRIGO: TC (tem-peratura di conser-vazione)	PRIORITA' secondo Risoluzione CEE 3 dic 1990	NOME COMMERCIALE	DEA	Punto di Primo Intervento (PPI) 1a Classe: OVADA	GUM TORTONA, FARMACIA ACQUI, FARMACIA CASALE	RIANIMA-ZIONE	SALA OPERATORIA
ACIDO FOLINICO - CALCIO LEVOFOLINATO			2	PREFOLIC*IM IV 6 FL 50MG+6 F (equivalente a 50 mg di acido follico e a mg.25 di acido levofolico)	NOVI (10 fiale) - CASALE (10 fiale)	NO	SI	NO	
ALCOOL ETILICO O ETANOLO (Alcool etilico sterile 95% fl)			1 (in quanto sostituisce fomi-pizolo)	Etanolo 40-70% 10ml fl.: UTILIZZARE, DILUENDOLE, LE FIALE DI ETANOLO STER. 95% ML.10 - LE FIALE VENGONO FORNITE CON ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' DA PARTE DEL MEDICO RICHIEDENTE, NON ESSENDO REGISTRATE IN ITALIA	SI	SI	SI	NO	
AMIDO di frumento, di riso o di mais o di fecola di patate			1		SI	SI	SI	NO	
FRAMMENTI ANTICORPALI ANTIVIPERA // SIERO ANTIVIPERA - ATTENZIONE: PERICOLO in caso di ALLERGIA, possibile SHOCK ANAFILATTICO: <u>RIVOLGERSI SEMPRE PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE AL CENTRO ANTIVELENI</u>		Conservare nella sua scatola alla T indicata sulla confezione	2		2 fiale al DEA di Novi Ligure.				
ATROPINA 0,5 mg. f.			1	Atropina 0,5 mg fl.	SI	SI	SI	SI	
BLU DI PRUSSIA (C.I. 77520)			3	Blu di Prussia 25 g polv.	CAV	NO		NO	
CALCIO CLORURO 10% da diluire			1	Calcio cloruro 10% 10 ml fl	SI	SI	SI	NO	
CALCIO EDETATO BISODICO G.1 ML.10, DA DILUIRE			2	Calcio Bisodico Edetato 10% fl, diluire in soluzione fisiologica 0,9% o glucosata 5% 500 ml	NOVI	NO	NO	NO	
CALCIO GLUCONATO da diluire			1	Calcio gluconato 10% 10 ml fl	SI	SI	SI	SI	
CALCIUM GEL			2	Calcium gel (galenico) 250 ml tub: a base di Calcio Gluconato 2,5% + Lidocaina 2% POI alla scadenza solo CAV	CAV	NO	NO		
CARBONE VEGETALE ATTIVATO IN POLVERE			1	Carbone attivato polvere (Carbomix gr. 50 granuli NON disponibile)	SI	SI	SI		
CARTINE DI TORNASOLE (range pH 1-14)			1		SI	SI			
CIPROEPTADINA SCIROPPO			2	Periactin	SI	NO			
COLESTIRAMINA			3	Questran 4 g 12 buste per os	SI	SI	SI		

PRINCIPIO ATTIVO	FRIGO: TC (tem-peratura di conser-vazione)	PRIORITA' secondo Risoluzione CEE 3 dic 1990	NOME COMMERCIALE	DEA	Punto di Primo Intervento (PPI) 1a Classe: OVADA	GUM TORTONA, FARMACIA ACQUI, FARMACIA CASALE	RIANIMA-ZIONE	SALA OPERATORIA
DANTROLENE	Non conservare a tem-peratura superiore ai 25°C.	1	Dantrium 20 mg fl	NO	NO	NO	36 fiale a Casale M	36 fiale sia ad Acqui T., sia a Novi L. che a Tortona
DEFEROXAMINA	T . infer. a + 25°C	2	Desferal 500 mg fic	NOVI (10 FIALE) - CASALE (10 FIALE)	SI	SI		
DIAZEPAM		1	Diazepam 10 mg fiale	SI	SI	SI		
DIMERCAPROLO	T.C. min +2°C max +25°C	2	B.A.L. 100 mg oppure da mg.200 (attualmente solo da mg.200) fl - FARMACO ESTERO	TENERE UNA CONFEZIONE POI CI SI RIVOLGE AL CENTRO ANTIVENEPI PER IL PROSEGUIMENTO DELLA TERAPIA	NO			
DISULFIRAM		3	Etiltox mg.200 cp o Antabuse dispergettes mg.400 (24 cpr efferv.)	NOVI - CASALE	SI	SI		
FAB ANTIDIGITALE antidigossina	T.C. da +2 a +8°C	1	Digifab mg.40 FARMACO ESTERO	2 F	1 F.			
FISOSTIGMINA SALICILATO (ESERINA)		1	Anticholium 2 mg fl - FARMACO ESTERO	SI	SI	SI		
FLUMAZENIL	T.C.infer. a +30°C	1	Anexate 0,5 mg fl	SI	SI	SI		
GLUCAGONE	T.C. da +2 a +8 °C	1	Glucagen 1 mg fl	3 fiale	30 fiale - non kit	3 fiale	30 fiale no kit: per l'avvelenamento da betabloccanti la quantità minima da utilizzare è di 100 fiale: quindi ove si presenti un caso, andranno recuperate tutte le fiale delle restanti Rianimazioni	
GLUCOSIO IPERTONICO		1	Glucosio 33% fl.10 ml.	SI	SI	SI		
IDARUCIZUMAB	T.C.: +2°C - +8°C. Non congelare. Al riparo dalla luce		Praxbind 2,5 g/50 ml soluzione iniettabile per infusione uso ev 2 flaconcini 50 ml. VEDI NOTA (1)	DEA di ACQUI TERME, CASALE MONFERRATO e NOVI LIGURE	NO	NO	NO	NO
IDROSSICOBALAMINA	T. max +25°C	1	La CONFEZIONE è di un flac. di Cyano-kit 5 g.	2 CONFEZIONI	1 CONFEZIONE			
INSULINA SOLUBILE AD ES. ACTRAPID + SOLUZIONE GLUCOSIO AL 50% ml.500 in TUTTI I REPARTI E AMBULATORI CHE UTILIZZANO IL POTASSIO CONCENTRATO: il glucosio al 50% va tenuto a parte, possibilmente insieme al Potassio, per non confonderlo con il glucosio a minore concentrazione!				SI	SI	SI	SI	

PRINCIPIO ATTIVO	FRIGO: TC (tem-peratura di conser-vazione)	PRIORITA' secondo Risoluzione CEE 3 dic 1990	NOME COMMERCIALE	DEA	Punto di Primo Intervento (PPI) 1a Classe: OVADA	GUM TORTONA, FARMACIA ACQUI, FARMACIA CASALE	RIANIMA-ZIONE	SALA OPERATORIA
IPECACUANA	T. inferiore a +25°C	1	Ipecac Syrup (USP) 7% 30ml scir PRODOTTO ESTERO (Canada)	2 FL	2 FL			
LABELALOLO	vedi confezione	1	Labetalolo Salf (ex Trandate) mg.100 ml.20 f.ev	SI	5 fiale	SI	Solo a Novi la Rianimazione stocca 40 f. e l'Ostetricia- Ginecologia 50 f.	
MAGNESIO SOLFATO (MgSO4)		1	Magnesio solfato 30g polv. Bustine	SI	SI	SI		
MANNITOLE 18% ml.250	tenere a temperatura ambiente perché a freddo cristallizza	2		SI	SI	SI		
METILTIONINIO (BLU DI METILENE)		1	Blu di metilene 1% 100 mg fl. ml.10	SI	SI	SI		
N-ACETILCISTEINA		2	Hidonac 5 g flc.	10	5	SI	NO	
NARCAN		1	Naloxone 0.4 mg fl	SI	SI	SI		
NEOSTIGMINA		1	Intrastigmina 500 mg fl	SI	SI	SI		
NITROPRUSSATO DI SODIO		1	Sodio nitroprussiato 100 mg fl	SI	SI	SI		
OLIO DI VASELINA FU PER OS		1	ML.200	SI	SI	SI		
MACROGOL (PEG) 4000 IN SOL. ELETTROLITICA		1	Moviprep polv. per soluz. orale in bustine 1 trattamento (attenzione: contiene acido ascorbico)	SI	SI	SI		
D-PENICILLAMINA (precedentem. Pemine) VEDI NOTA (2)		3	D-PENICILLAMINA mg.150 cps confezioni da 50 cps	OSPEDALE DI TORTONA - in ogni caso è disponibile presso CAV				
PRALIDOSSIMA		2	Contrathion 200 mg fl	20 FIALE poi CAV	SI	SI		
PROTAMINA CLORIDRATO		1	Protamina 50 mg fl	SI	SI	SI		
SIERO ANTIBOTULINICO	vedere confezione	3	Antitoxinum Botulinicum Polyvalent ABE fl Biomed	CAV	CAV			
SIERO ANTIMALMIGNATTA	vedere confezione	3		CAV	CAV			
SIMETICONE		1	Mylicon gtt 30 ml	SI	SI	SI		
SODIO BICARBONATO 8,4% ML.100		1	Bicarbonato di sodio 8.4% flc	SI	SI	SI		
Sodio polistirensulfonato VEDI NOTA (3)	Kayexalate		Kayexalate 100 mg/g polvere per sospensione orale flac. 454 g	SI	NO			
SODIO TIOSOLFATO (IPOSOLFITO)		1	Sodio iposolfito 10% fl 10 ml	SI	SI	SI		
SUCCIMER	TC max +25°C	3		CAV	CAV			
TERRA DI FULLER (BENTONITE IN SOSPENSIONE ACQUOSA AL 30%-PER SONDA ORALE) : LA TERRA DI FULLER PUO' ESSERE SOSTITUITA DAL CARBONE ATTIVATO. (FONTE: MARRUBINI, INTOSSICAZIONI ACUTE)		2	Terra di Fuller 30 g polv	QUESTO ANTIDOTO NON VIENE PIU' FORNITO DALLA DITTA: PRESENTE AD ACQUI, CASALE E NOVI FINO ALLA SCADENZA - REPERIBILE PRESSO CAV				
Vitamina B1 (Tiamina)		2	Vitamina B1 mg.200 Salf 100 mg/ml - 2 ml	SI	SI			
VIT. B6 (Piridossina)		2	Benadon 300 mg fl	SI	SI	SI		

ANTIDOTI, INDICAZIONI , QUANTITA' MINIME E FARMACI PER EMERGENZA TERRORISMO

PRINCIPIO ATTIVO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO / intossicazione da -	Quantitativi presenti obbligatoriamente nel sito di stoccaggio (escluso farmacia)	Emerg. terrorismo
ACIDO FOLINICO - CALCIO LEVOFOLINATO	metotrexate, pirimetamina, metanolo	10 fiale solo NOVI - CASALE	
ALCOL ETILICO O ETANOLO (Alcool etilico sterile 95% fl)	glicole etilenico, metanolo	60-80 f.	
AMIDO di frumento, di riso o di mais o di fecola di patate	iodio	500 g.	
FRAMMENTI ANTICORPALI ANTIVIPERA // SIERO ANTIVIPERA - ATTENZIONE: PERICOLO in caso di ALLERGIA, possibile SHOCK ANAFILATTICO: <u>RIVOLGERSI SEMPRE PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE AL CENTRO ANTIVELENI</u>	morso da vipera europea: l'uso è più appropriato in caso di forte intossicazione	2 fiale al DEA di Novi Ligure: la seconda fiala serve solo successivamente, se se ne richiede l'uso.	
ATROPINA 0,5 mg. f.	carbamati, esteri organofosforici (insetticidi)	100 fiale	si
BLU DI PRUSSIA (C.I. 77520)	tallio (metallo pesante)	CAV	
CALCIO CLORURO 10% da diluire	acido fluoridrico, fluoruri, ossalati	10 fiale	
CALCIO EDETATO BISODICO G.1 ML.10, DA DILUIRE	piombo	20 fiale	
CALCIO GLUCONATO da diluire	acido fluoridrico, fluoruri, ossalati, POTASSIO (VEDI NOTA IN BASSO PER IPERPOTASSIEMIA)	almeno 10 fiale per DEA o PPI - DEVONO AVERLO TUTTI I REPARTI E AMBULATORI CHE UTILIZZANO IL POTASSIO CONCENTRATO	si
CALCIUM GEL	ac fluoridrico, contatto cutaneo con ac. fluoridrico	CAV	
CARBONE VEGETALE ATTIVATO IN POLVERE	adsorbente	Carbone attivato 10 confezioni da g.50 (totale 500 g) - NON DISPONIBILE: 10 fl. Carbomix os granulato per sospensione 50 g	
CARTINE DI TORNASOLE (range pH 1-14)	per determinazione in urgenza delle soluzioni presunte caustiche/corrosive	N.1 confezione	
CIPROPTADINA SCIROPP0	Sindrome serotoninergica	N.1 per DEA	
COLESTIRAMINA	digitossina	1 conf.	
DANTROLENE	ipertermia maligna	36 fl.	
DEFEROXAMINA	ferro, alluminio	10 fiale	
DIAZEPAM	cloroquina (anticonvulsivante)	30 fiale	si
DIMERCAPROLO	arsenico, oro, mercurio inorganico, piombo	UNA CONFEZ. PER DEA	si
DISULFIRAM	Nickel	2 conf. di Etiltox mg.200 oppure 1 confezione di Antabuse mg.400 sia A CASALE che a NOVI	
FAB ANTIDIGITALE antidigossina	Digossina	2f per DEA e 1 f per PPI	
FISOSTIGMINA SALICILATO (ESERINA)	ATROPINA e ANTICOLINERGICI (sindrome colinergica centrale)	5 fiale da mg.2	si
FLUMAZENIL	benzodiazepine	20 f. da 0,5 mg.	
GLUCAGONE	insulina, Betabloccanti, Calcioantagonisti	3 FIALE in ogni DEA, 30 nel PPI di Ovada e 30 fiale in ogni Rianimazione	

PRINCIPIO ATTIVO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO / intossicazione da -	Quantitativi presenti obbligatoriamente nel sito di stoccaggio (escluso farmacia)	Emerg. terrorism o
GLUCOSIO IPERTONICO	coma ipoglicemico	50 FIALE	
IDARUCIZUMAB	Praxbind è un inattivatore specifico per dabigatran ed è indicato nei pazienti adulti trattati con Pradaxa (dabigatran etexilato) nei casi in cui si rende necessaria l'inattivazione rapida dei suoi effetti anticoagulanti: 1) Negli interventi chirurgici di emergenza/nelle procedure urgenti. 2) Nel sanguinamento potenzialmente fatale o non controllato.	1 CONFEZIONE contenente 2 flaconcini da 2,5 g/50 ml di soluzione iniettabile per infusione uso ev	NO
IDROSSICOBALAMINA	cianuri	2 confezioni per DEA ASL AL e 1 confezione per PPI	si
INSULINA SOLUBILE AD ES. ACTRAPID + SOLUZIONE GLUCOSIO AL 50% ml.500	POTASSIO (VEDI NOTA IN BASSO PER IPERPOTASSIEMIA)	1 FLAC. ACTRAPID + n.X FLAC GLUCOSIO 50 % in TUTTI I REPARTI E AMBULATORI CHE UTILIZZANO IL POTASSIO CONCENTRATO	
IPECACUANA	emetico	2 FL.	
LABETALOLO	alfa-adrenergici	5 FIALE	
MAGNESIO SOLFATO (MgSO4)	catartico		
MANNITOLE 18% ml.250	catartico	3-4 flac	
METILTIONINIO (BLU DI METILENE)	metaemoglobinemia	10 FIALE	SI
N-ACETILCISTEINA	PARACETAMOLO, amanita, idrocarburi clorurati	10 f in ogni DEA, 5 f nel PPI di Ovada	SI
NARCAN	oppioidi	15 FIALE	
NEOSTIGMINA	curari, anticolinergici periferici	10 FIALE	
NITROPRUSSATO DI SODIO	ergotismo	10 FIALE	
OLIO DI VASELINA FU PER OS	antidoto aspecifico e universale delle sostanze liposolubili, in quanto non assorbito	2 FLAC	
MACROGOL (PEG) 4000 IN SOL. ELETTROLITICA	catartico	1 CONFEZIONE	
D-PENICILLAMINA (precedentem. Pemine) VEDI NOTA (2)	PIOMBO, rame, oro, mercurio, zinco	5 conf.= 250 cps	
PRALDOSSIMA	esteri organofosforici (insetticidi)	20 FLAC IN OGNI PRESIDIO POI CAV	si
PROTAMINA CLORIDRATO	eparina	5 FIALE	
SIERO ANTIBOTULINICO	botulismo	disponibile presso CAV. e Ospedali Regionali	si
SIERO ANTIMALMIGNATTA	puntura della malmignatta		
SIMETICONE	antischiuma	5 conf.	
SODIO BICARBONATO 8,4% ML.100	alcalinizzazione plasma e urine	25 FLAC	
Sodio polistirensulfonato	per il trattamento di iperkaliemia ed iperfosfatemia	1 FLAC.	
SODIO TIOSOLFATO (IPOSOLFITO)	cianuri, acido cianidrico	50 fiale per una terapia	si
SUCCIMER	Metalli	CAV	si
TERRA DI FULLER (BENTONITE IN SOSPENSIONE ACQUOSA AL 30%-PER SONDA ORALE) : LA TERRA DI FULLER PUO' ESSERE SOSTITUITA DAL CARBONE ATTIVATO. (FONTE: MARRUBINI, INTOSSICAZIONI ACUTE)	paraquat (erbicida di contatto), diquat	30 flac. <u>Non In Vendita</u>	
Vitamina B1 (Tiamina)	alcol etilico e glicol etilenico	10 f da 200 mg	
VIT. B6 (Piridossina)	isoniazide, idrazina, crimidina, giromitrina	2 conf. da 6 fiale	
VITAMINA C (acido ascorbico)	acidificazione urine, metaemoglobinemia (emoglobina con ferro ossidato)	30 fiale	
VITAMINA K (fitomenadione)	anticoagulanti cumarinici	21 FIALE	
OSSIGENO	Monossido di carbonio (CO), cianuri, idrogeno solforato		