

ANTIDOTI ASL AL

LE STRUTTURE DI STOCCAGGIO INDICATE SONO RESPONSABILI DEL MANTENIMENTO E DEL RINNOVO DELLE SCORTE CONCORDATE. SI RACCOMANDA DI CONTROLLARE LE SCADENZE MENSILMENTE. LE QUANTITA' INDICATE SONO QUELLE MINIME DA TENERE IN DOTAZIONE

CAV=CENTRO ANTIVELENI DI PAVIA	GLI ANTIDOTI DI PRIORITA' UNO DEVONO ESSERE PRESENTI SIA NEI DEA (Pronto Soccorso Tortona - Novi L. - Acqui T. - Casale M.) CHE NEI Punti di Primo Intervento (PPI) (Pronto Soccorso Ovada)				Centro Antiveleni di Pavia via Salvatore Maugeri 10, 27100 Pavia						
					IL NUMERO ATTIVO PER LE EMERGENZE è 0382 24444						
PRINCIPIO ATTIVO	FRIGO: TC (temperatura di conservazione); SCADENZE	PRIORITA' secondo Risoluzione CEE 3 dic 1990	NOME COMMERCIALE	DEA	Punto di Primo Intervento (PPI) 1a Classe: OVADA	FARMACIA	RIANIMAZIONE	SALA OPERATORIA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO / intossicazione da -	Quantitativi presenti obbligatoriamente nel sito di stoccaggio escluso FARMACIA	Emerg terroristico
ACIDO FOLICO/ FOLINICO		2	Sanifolin (calcio levofolinato pentaidrato) fl im ev 50 mg o Levofolene (calcio levofolinato pentaidrato) 25 mg fle.lio.	NOVI (10 fiale) - CASALE (10 fiale)	NO	SI	NO		metotrexate, pirimetamina, metanolo	10 fiale solo NOVI - CASALE	
ALCOL ETILICO O ETANOLO (Alcool etilico sterile 95% fl)		1 (in quanto sostituisce e fomipizolo)	Etanolo 40-70% 10ml fl.: UTILIZZARE, DILUENDOLE, LE FIALE DI ETANOLO STER. 95% ML.10 - LE FIALE VENGONO FORNITE CON ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' DA PARTE DEL MEDICO RICHIEDENTE, NON ESSENDO REGISTRATE IN ITALIA	SI	SI	SI	NO		glicole etilenico, metanolo	60-80 f.	
AMIDO di frumento, di riso o di mais o di fecola di patate		1		SI	SI	SI	NO		Iodio	500 g.	
ANTITOSSINA DEL VELENO DI VIPERA EUROPEA 500 j.a.: contiene IMMUNOGLOBULINA G EQUINA: ATTENZIONE: PERICOLO in caso di ALLERGIA, possibile SHOCK ANAFILATTICO: RIVOLGERSI SEMPRE PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE AL CENTRO ANTIVELENI	Il farmaco deve essere tenuto in frigorifero tra + 2 e +8°C. Non congelare. Proteggere la fiala dalla luce tenendola nella sua scatola.	2	Immunoserum contra venena viperarum europaeorum	2 fiale al DEA di Novi Ligure. Per bambini e adulti si usa una fiala da 500 j.a. La seconda fiala serve solo successivamente, se se ne richiede l'uso.					morso da vipera europea: l'uso è più appropriato in caso di forte intossicazione	2 fiale al DEA di Novi Ligure: la seconda fiala serve solo successivamente, se se ne richiede l'uso.	
ATROPINA 0,5 mg. - 1 mg f.		1	Atropina 0.5 - 1 mg fl.	SI	SI	SI	SI		carbamati, esteri organofosforici (insetticidi)	50 fiale	si
BLU DI PRUSSIA (C.I. 77520)		3	Blu di Prussia 25 g polv.	CAV	NO		NO		tallio (metallo pesante)	CAV	
CALCIO CLORURO da diluire		1	Calcio cloruro 10% 10 ml fl	SI	SI	SI	NO		acido fluoridrico, fluoruri, ossalati	10 fiale	

PRINCIPIO ATTIVO	FRIGO: TC (temperatura di conservazione); SCADENZE	PRIORITA' secondo Risoluzione CEE 3 dic 1990	NOME COMMERCIALE	DEA	Punto di Primo Intervento (PPI) 1a Classe: OVADA	FARMACIA	RIANIMAZIONE	SALA OPERATORIA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO / intossicazione da -	Quantitativi presenti obbligatoriamente nel sito di stoccaggio escluso FARMACIA	Emergenza terroristica
CALCIO EDETATO BISODICO G.1 ML.10, DA DILUIRE		2	Calcio Bisodico Edetato 10% fl, diluire in soluzione fisiologica 0,9% o glucosata 5% 500 ml	NOVI	NO	NO	NO		piombo	20 fiale	
CALCIO GLUCONATO da diluire		1	Calcio gluconato 10% 10 ml fl	SI	SI	SI	SI		acido fluoridrico, fluoruri, ossalati, POTASSIO (VEDI NOTA IN BASSO PER IPERPOTASSIEMIA)	almeno 10 fiale per DEA o PPI - DEVONO AVERLO TUTTI I REPARTI E AMBULATORI CHE UTILIZZANO IL POTASSIO CONCENTRATO	si
CALCIUM GEL		2	Calcium gel (galenico) 250 ml tub: a base di Calcio Gluconato 2,5% + Lidocaina 2% POI alla scadenza solo CAV	CAV	NO	NO			ac fluoridrico, contatto cutaneo con ac. fluoridrico	CAV	
CARBONE VEGETALE ATTIVATO IN POLVERE		1	Carbomix gr. 50 granuli oppure Carbone attivato polvere	SI	SI	SI			adsorbente	10 fl. Carbomix os granulato per sospensione 50 g oppure Carbone attivato 10 confezioni da g.50 (totale 500 g)	
CARTINE DI TORNASOLE (range pH 1-14)		1		SI	SI				per determinazione in urgenza delle soluzioni presunte caustiche/corrosive	N.1 confezione	
CIPROEPTADINA SCIROPPO		2	Periactin	SI	NO				Sindrome serotoninergica	N.1 per DEA	
COLESTIRAMINA		3	Questran 4 g 12 buste per os	SI	NO	SI			digitossina	1 conf.	
DANTROLENE	Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.	1	Dantrium 20 mg fl	NO	NO	NO	36 fiale a Casale M	36 fiale sia ad Acqui T., sia a Novi L. che a Tortona	ipertermia maligna	36 fl.	
DEFEROXAMINA	T . infer. a + 25°C	2	Desferal 500 mg flc	NOVI (10 FIALE) - CASALE (10 FIALE)	NO	SI			ferro, alluminio	10 fiale	
DIAZEPAM		1	Diazepam 10 mg fiale	SI	SI	SI			clorochina (anticonvulsivante)	30 fiale	si
	segue										

PRINCIPIO ATTIVO	FRIGO: TC (temperatura di conservazione); SCADENZE	PRIORI TA' secondo Risoluzione CEE 3 dic 1990	NOME COMMERCIALE	DEA	Punto di Primo Intervento (PPI) Ia Classe: OVADA	FARMACIA	RIANIMAZIONE	SALA OPERATORIA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO / intossicazione da -	Quantitativi presenti obbligatoriamente nel sito di stoccaggio escluso FARMACIA	Emerg terroris mo
DIMERCAPROLO	T.C. min +2°C max +25°C	2	B.A.L. 100 mg oppure da mg.200 (attualmente solo da mg.200) fl - FARMACO ESTERO	TENERE UNA CONFEZIONE POI CI SI RIVOLGE AL CENTRO ANTIVELENI PER IL PROSEGUIMEN TO DELLA TERAPIA	NO				arsenico, oro, mercurio inorganico, piombo	UNA CONFEZ. PER DEA	si
DISULFIRAM		3	Etiltox mg.200 cp o Antabuse dispergettes mg.400 (24 cpr efferv.)	NOVI - CASALE	NO	SI			Nickel	2 conf. di Etiltox mg.200 oppure 1 confezione di Antabuse mg.400 sia A CASALE che a NOVI	
FAB ANTIDIGITALE antidigossina	T.C. da +2 a +8°C	1	Digifab mg.40 (INOVI9534) FARMACO ESTERO	2 F	1 F.				Digossina	2f per DEA e 1 f per PPI	
FISOSTIGMINA SALICILATO (ESERINA)		1	Anticholium 2 mg fl - FARMACO ESTERO	SI	SI	SI			ATROPINA e ANTICOLINERGICI (sindrome colinergica centrale)	5 fiale da mg.2	si
FLUMAZENIL	T.C.infer. a +30°C	1	Anexate 0,5 mg fl	SI	SI	SI			benzodiazepine	20 f. da 0,5 mg.	
	segue										
GLUCAGONE	T.C. da +2 a +8 °C	1	Glucagen 1 mg fl	3 fiale	25 fiale	3 fiale	25 fiale: per l'avvelenamento da betabloccanti la quantità minima da utilizzare è di 100 fiale: quindi ove si presenti un caso, andranno recuperate tutte le fiale delle restanti Rianimazioni dell'ASL		insulina, Betabloccanti, Calcioantagonisti	3 FIALE (25 fiale in Rianimazione)	
GLUCOSIO IPERTONICO		1	Glucosio 33% fl.10 ml.	SI	SI	SI			coma ipoglicemico	50 FIALE	

PRINCIPIO ATTIVO	FRIGO: TC (temperatura di conservazione); SCADENZE	PRIORI TA' secondo Risoluzione CEE 3 dic 1990	NOME COMMERCIALE	DEA	Punto di Primo Intervento (PPI) Ia Classe: OVADA	FARMACIA	RIANIMAZIONE	SALA OPERATORIA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO / intossicazione da -	Quantitativi presenti obbligatoriamente nel sito di stoccaggio escluso FARMACIA	Emerg terroris mo
IDROSSICOBALAMINA	T. max +25°C	1	CONFEZIONE di un flac. di Cyano-kit 5 g. (oppure CONFEZIONE di 2 flac. di Cyano-kit 2.5 g.) ATTENZIONE: il dosaggio da g.2,5 non è più prodotto	2 CONFEZIONI	1 CONFEZIO NE				cianuri	2 confezioni per DEA ASL AL e 1 confezione per PPI	si
INSULINA SOLUBILE AD ES. ACTRAPID + SOLUZIONE GLUCOSIO AL 50% ml.500 in TUTTI I REPARTI E AMBULATORI CHE UTILIZZANO IL POTASSIO CONCENTRATO: il glucosio al 50% va tenuto a parte, possibilmente insieme al Potassio, per non confonderlo con il glucosio a minore concentrazione!				SI	SI	SI	SI		POTASSIO (VEDI NOTA IN BASSO PER IPERPOTASSIEMIA)	1 FLAC. ACTRAPID + n.X FLAC GLUCOSIO 50 % in TUTTI I REPARTI E AMBULATORI CHE UTILIZZANO IL POTASSIO CONCENTRATO	
IPECACUANA		1	Ipecacuana 7% 100 ml scir	1 FL	1 FL	SI			emetico	1 FL.	
LABETALOLO	vedi confezione	1	Labetalolo o Trandate mg.100 ml.20 f.ev FARMACO ESTERO	SI	SI	SI			alfa-adrenergici	5 FIALE	
MAGNESIO SOLFATO (MgSO4)		1	Magnesio solfato 30g polv. Bustine	SI	SI	SI			catartico		
MANNITOLE 18% ml.250	tenere a temperatura ambiente perché a freddo cristallizza	2		SI	NO	SI			catartico	3-4 flac	
METILTIONINIO (BLU DI METILENE)		1	Blu di metilene 1% 100 mg fl. ml.10	SI	SI	SI			metaemoglobinemia	10 FIALE	si
N-ACETILCISTEINA		2	Hidonac 5 g flc.	5	3	SI	NO		PARACETAMOLO, amanita, idrocarburi clorurati	5 FL in ogni DEA o 3 FL nei PPI (e non più 20 FLAC PER PRESIDIO)	si
NARCAN		1	Naloxone 0.4 mg fl	SI	SI	SI			oppioidi	15 FIALE	
NEOSTIGMINA		1	Intrastigmina 500 mg fl	SI	SI	SI			curari, anticolinergici periferici	10 FIALE	
NITROPRUSSATO DI SODIO		1	Sodio nitroprussiato 100 mg fl	SI	SI	SI			ergotismo	10 FIALE	
OLIO DI VASELINA FU PER OS		1	ML.200	SI	SI	SI			antidoto aspecifico e universale delle sostanze liposolubili, in quanto non assorbito	2 FLAC	

PRINCIPIO ATTIVO	FRIGO: TC (temperatura di conservazione); SCADENZE	PRIORI TA' secondo Risoluzione CEE 3 dic 1990	NOME COMMERCIALE	DEA	Punto di Primo Intervento (PPI) Ia Classe: OVADA	FARMACIA	RIANIMAZIONE	SALA OPERATORIA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO / intossicazione da -	Quantitativi presenti obbligatoriamente nel sito di stoccaggio escluso FARMACIA	Emerg terroris mo
MACROGOL (PEG) 4000 IN SOL. ELETTROLITICA		1	Moviprep polv. per soluz. orale in bustine 1 trattamento (attenzione: contiene acido ascorbico)	SI	SI	SI			catartico	1 CONFEZIONE	
D-PENICILLAMINA (precedentem. Pemine): l'uso come antidoto nelle intossicazioni da piombo è, dal luglio 2011, ricompreso nell'elenco principale della legge 648/96 e pertanto quando lo dovesse usare, il clinico deve fare il monitoraggio clinico inviandone copia alla farmacia che effettua il monitoraggio economico trimestrale ad AIFA		3	D-PENICILLAMINA mg.150 cps confezioni da 50 cps	OSPEDALE DI TORTONA - in ogni caso è disponibile presso CAV					PIOMBO, rame, oro, mercurio, zinco	5 conf.= 250 cps	
PIRIDOSSINA (VIT. B6)		2	Benadon 300 mg fl	SI		SI			isoniazide, idrazina, crimidina, giromitrina	2 conf. da 6 fiale	
PRALIDOSSIMA		2	Contrathion 200 mg fl	20 FIALE poi CAV					esteri organofosforici (insetticidi)	20 FLAC IN OGNI PRESIDIO POI CAV	si
PROTAMINA CLORIDRATO		1	Protamina 50 mg fl	SI	SI	SI			eparina	5 FIALE	
SIERO ANTIBOTULINICO	vedere confezione	3	Antitoxinum Botulinicum Polyvalent ABE fl Biomed	CAV	CAV				botulismo	disponibile presso CAV. e Ospedali Regionali	si
SIERO ANTIMALMIGNATTA	vedere confezione	3		CAV	CAV				puntura della malmignatta		
SIMETICONE		1	Mylicon gtt 30 ml	SI	SI	SI			antischiuma	5 conf.	
SODIO BICARBONATO 8,4% ML.100		1	Bicarbonato di sodio 8.4% flc	SI	SI	SI			alcalinizzazione plasma e urine	25 FLAC	
Sodio polistirensulfonato	Kayexalate		Kayexalate 100 mg/g polvere per sospensione orale flac. 454 g	SI	NO				per il trattamento di iperkaliemia ed iperfosfatemia: KAYEXALATE 4.4-Avvertenze speciali e precauzioni di impiego - Alternative terapeutiche nell'iperpotassiemia grave: poichè per un efficace abbassamento del potassio sierico con KAYEXALATE possono essere necessarie ore o giorni, il trattamento con questo farmaco da solo può non bastare a correggere rapidamente una grave iperpotassiemia provocata da condizioni di rapida distruzione di tessuti, come esempio nelle ustioni e nell'insufficienza renale.	1 FLAC.	
SODIO TIOSOLFATO (IPOSOLFITO)		1	Sodio iposolfito 10% fl 10 ml	SI	SI	SI			cianuri, acido cianidrico	50 fiale per una terapia	si
SUCCIMER	TC max +25°C	3		CAV	CAV				Metalli	CAV	si

