

## ANTIDOTI ASL AL

LE STRUTTURE DI STOCCAGGIO INDICATE SONO RESPONSABILI DEL MANTENIMENTO E DEL RINNOVO DELLE SCORTE CONCORDATE. SI RACCOMANDA DI CONTROLLARE LE SCADENZE MENSILMENTE. LE QUANTITA' INDICATE SONO QUELLE MINIME DA TENERE IN DOTAZIONE

SI RACCOMANDA AI REPARTI O SERVIZI INTERESSATI DI STAMPARE UNA COPIA AGGIORNATA E TENERLA BENE IN VISTA A DISPOSIZIONE IN CASO DI EMERGENZA, INSIEME A QUELLA DEI "SALVAVITA"

CAV=CENTRO ANTIVELENI DI PAVIA	GLI ANTIDOTI DI PRIORITA' UNO DEVONO ESSERE PRESENTI SIA NEI DEA (Pronto Soccorso Tortona - Novi L. - Acqui T. - Casale M.) CHE NEI Punti di Primo Intervento (PPI) (Pronto Soccorso Ovada)				Centro Antiveleni di Pavia via Salvatore Maugeri 10, 27100 Pavia						
					IL NUMERO ATTIVO PER LE EMERGENZE è 0382 24444						
PRINCIPIO ATTIVO	FRIGO: TC (temperatura di conservazione); SCADENZE	PRIORITA' secondo Risoluzione CEE 3 dic 1990	NOME COMMERCIALE	DEA	Punto di Primo Intervento (PPI) 1a Classe: OVADA	GUM TORTONA, FARMACIA ACQUI, FARMACIA CASALE	RIANIMAZIONE	SALA OPERATORIA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO / intossicazione da -	Quantitativi presenti obbligatoriamente nel sito di stoccaggio (escluso farmacia)	Emerg terrorismo
ACIDO FOLICO/ FOLINICO		2	Sanifolin (calcio levofolinato pentaidrato) fl im ev 50 mg o Levofolene (calcio levofolinato pentaidrato) 25 mg flc.li.	NOVI (10 fiale) - CASALE (10 fiale)	NO	SI	NO		metotrexate, pirimetamina, metanolo	10 fiale solo NOVI - CASALE	
ALCOL ETILICO O ETANOLO (Alcool etilico sterile 95% fl)		1 (in quanto sostituisce fomipizolo)	Etanolo 40-70% 10ml fl.: UTILIZZARE, DILUENDELE, LE FIALE DI ETANOLO STER. 95% ML.10 - LE FIALE VENGONO FORNITE CON ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' DA PARTE DEL MEDICO RICHIEDENTE, NON ESSENDO REGISTRATE IN ITALIA	SI	SI	SI	NO		glicole etilenico, metanolo	60-80 f.	
AMIDO di frumento, di riso o di mais o di fecola di patate		1		SI	SI	SI	NO		Iodio	500 g.	
ANTITOSSINA DEL VELENO DI VIPERA EUROPEA 500 j.a.: contiene IMMUNOGLOBULINA G EQUINA: ATTENZIONE: PERICOLO in caso di ALLERGIA, possibile SHOCK ANAFILATTICO: <u>RIVOLGERSI SEMPRE PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE AL CENTRO ANTIVELENI</u>	Il farmaco deve essere tenuto in frigorifero tra +2 e +8°C. Non congelare. Proteggere la fiala dalla luce tenendola nella sua scatola.	2	Immunoserum contra venena viperarum europaeorum	2 fiale al DEA di Novi Ligure. Per bambini e adulti si usa <u>una fiala da 500 j.a.</u> La seconda fiala serve solo successivamente, se se ne richiede l'uso.					morso da vipera europea: l'uso è più appropriato in caso di forte intossicazione	2 fiale al DEA di Novi Ligure: la seconda fiala serve solo successivamente, se se ne richiede l'uso.	
ATROPINA 0,5 mg. - 1 mg f.		1	Atropina 0.5 - 1 mg fl.	SI	SI	SI	SI		carbamati, esteri organofosforici (insetticidi)	50 fiale	si
BLU DI PRUSSIA (C.I. 77520)		3	Blu di Prussia 25 g polv.	CAV	NO		NO		tallio (metallo pesante)	CAV	
CALCIO CLORURO 10% da diluire		1	Calcio cloruro 10% 10 ml fl	SI	SI	SI	NO		acido fluoridrico, fluoruri, ossalati	10 fiale	
CALCIO EDETATO BISODICO G.1 ML.10, DA DILUIRE		2	Calcio Bisodico Edetato 10% fl, diluire in soluzione fisiologica 0,9% o glucosata 5% 500 ml	NOVI	NO	NO	NO		piombo	20 fiale	
CALCIO GLUCONATO da diluire		1	Calcio gluconato 10% 10 ml fl	SI	SI	SI	SI		acido fluoridrico, fluoruri, ossalati, POTASSIO (VEDI NOTA IN BASSO PER IPERPOTASSIEMIA)	almeno 10 fiale per DEA o PPI - DEVONO AVERLO TUTTI I REPARTI E AMBULATORI CHE UTILIZZANO IL POTASSIO CONCENTRATO	si

PRINCIPIO ATTIVO	FRIGO: TC (temperatura di conservazione); SCADENZE	PRIORITA' secondo Risoluzione CEE 3 dic 1990	NOME COMMERCIALE	DEA	Punto di Primo Intervento (PPI) 1a Classe: OVADA	GUM TORTONA, FARMACIA ACQUI, FARMACIA CASALE	RIANIMAZIONE	SALA OPERATORIA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO / intossicazione da -	Quantitativi presenti obbligatoriamente nel sito di stoccaggio (escluso farmacia)	Emerg terrorismo
CALCIUM GEL		2	Calcium gel (galenico) 250 ml tub: a base di Calcio Gluconato 2,5% + Lidocaina 2% POI alla scadenza solo CAV	CAV	NO	NO			ac fluoridrico, contatto cutaneo con ac. fluoridrico	CAV	
CARBONE VEGETALE ATTIVATO IN POLVERE		1	Carbomix gr. 50 granuli oppure Carbone attivato polvere	SI	SI	SI			adsorbente	10 fl. Carbomix os granulato per sospensione 50 g oppure Carbone attivato 10 confezioni da g.50 (totale 500 g)	
CARTINE DI TORNASOLE (range pH 1-14)		1		SI	SI				per determinazione in urgenza delle soluzioni presunte caustiche/corrosive	N.1 confezione	
CIPROEPTADINA SCIROPPO		2	Periactin	SI	NO				Sindrome serotoninergica	N.1 per DEA	
COLESTIRAMINA		3	Questran 4 g 12 buste per os	SI	SI	SI			digitossina	1 conf.	
DANTROLENE	Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.	1	Dantrium 20 mg fl	NO	NO	NO	36 fiale a Casale M	36 fiale sia ad Acqui T., sia a Novi L. che a Tortona	ipertermia maligna	36 fl.	
DEFEROXAMINA	T. infer. a + 25°C	2	Desferal 500 mg flc	NOVI (10 FIALE) - CASALE (10 FIALE)	SI	SI			ferro, alluminio	10 fiale	
DIAZEPAM		1	Diazepam 10 mg fiale	SI	SI	SI			clorochina (anticonvulsivante)	30 fiale	si
DIMERCAPROLO	T.C. min +2°C max +25°C	2	B.A.L. 100 mg oppure da mg.200 (attualmente solo da mg.200) fl - FARMACO ESTERO	TENERE UNA CONFEZIONE POI CI SI RIVOLGE AL CENTRO ANTIVELENI PER IL PROSEGUIMENTO DELLA TERAPIA	NO				arsenico, oro, mercurio inorganico, piombo	UNA CONFEZ. PER DEA	si
DISULFIRAM		3	Etiltox mg.200 cp o Antabuse dispergettes mg.400 (24 cpr efferv.)	NOVI - CASALE	SI	SI			Nickel	2 conf. di Etiltox mg.200 oppure 1 confezione di Antabuse mg.400 sia A CASALE che a NOVI	
FAB ANTIDIGITALE antidigossina	T.C. da +2 a +8°C	1	Digifab mg.40 (1NOVI9534) FARMACO ESTERO	2 F	1 F.				Digossina	2f per DEA e 1 f per PPI	
FISOSTIGMINA SALICILATO (ESERINA)		1	Anticholium 2 mg fl - FARMACO ESTERO	SI	SI	SI			ATROPINA e ANTICOLINERGICI (sindrome colinergica centrale)	5 fiale da mg.2	si
FLUMAZENIL	T.C.infer. a +30°C	1	Anexate 0,5 mg fl	SI	SI	SI			benzodiazepine	20 f. da 0,5 mg.	
GLUCAGONE	T.C. da +2 a +8 °C	1	Glucagen 1 mg fl	3 fiale	30 fiale - non kit	3 fiale		30 fiale no kit: per l'avvelenamento da betabloccanti la quantità minima da utilizzare è di 100 fiale: quindi ove si presenti un caso, andranno recuperate tutte le fiale delle restanti Rianimazioni dell'ASL	insulina, Betabloccanti, Calcioantagonisti	3 FIALE in ogni DEA, 30 nel PPI di Ovada e 30 fiale in ogni Rianimazione	
GLUCOSIO IPERTONICO		1	Glucosio 33% fl.10 ml.	SI	SI	SI			coma ipoglicemico	50 FIALE	

PRINCIPIO ATTIVO	FRIGO: TC (temperatura di conservazione); SCADENZE	PRIORITA' secondo Risoluzione CEE 3 dic 1990	NOME COMMERCIALE	DEA	Punto di Primo Intervento (PPI) 1a Classe: OVADA	GUM TORTONA, FARMACIA ACQUI, FARMACIA CASALE	RIANIMAZIONE	SALA OPERATORIA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO / intossicazione da -	Quantitativi presenti obbligatoriamente nel sito di stoccaggio (escluso farmacia)	Emerg terrorismo
IDARUCIZUMAB	T.C.: +2°C - +8°C. Non congelare. Al riparo dalla luce		Praxbind 2,5 g/50 ml soluzione iniettabile per infusione uso ev 2 flaconcini 50 ml. Quando si è in prossimità della scadenza occorre segnalare la prossima scadenza alla farmacia di competenza territoriale che ne chiederà la sostituzione da parte della Ditta.	DEA di ACQUI TERME, CASALE MONFERRATO e NOVI LIGURE	NO	NO	NO	NO	Praxbind è un inattivatore specifico per dabigatran ed è indicato nei pazienti adulti trattati con Pradaxa (dabigatran etexilato) nei casi in cui si rende necessaria l'inattivazione rapida dei suoi effetti anticoagulanti: 1) Negli interventi chirurgici di emergenza/nelle procedure urgenti. 2) Nel sanguinamento potenzialmente fatale o non controllato.	1 CONFEZIONE contenente 2 flaconcini da 2,5 g/50 ml di soluzione iniettabile per infusione uso ev	NO
IDROSSICOBALAMINA	T. max +25°C	1	CONFEZIONE di un flac. di Cyano-kit 5 g. (oppure CONFEZIONE di 2 flac. di Cyano-kit 2.5 g.) ATTENZIONE: il dosaggio da g.2,5 non è più prodotto	2 CONFEZIONI	1 CONFEZIONE				cianuri	2 confezioni per DEA ASL AL e 1 confezione per PPI	si
INSULINA SOLUBILE AD ES. ACTRAPID + SOLUZIONE GLUCOSIO AL 50% ml.500 in TUTTI I REPARTI E AMBULATORI CHE UTILIZZANO IL POTASSIO CONCENTRATO: il glucosio al 50% va tenuto a parte, possibilmente insieme al Potassio, per non confonderlo con il glucosio a minore concentrazione!				SI	SI	SI	SI	POTASSIO (VEDI NOTA IN BASSO PER IPERPOTASSIEMIA)		1 FLAC. ACTRAPID + n.X FLAC GLUCOSIO 50 % in TUTTI I REPARTI E AMBULATORI CHE UTILIZZANO IL POTASSIO CONCENTRATO	
IPECACUANA		1	Ipecacuana 7% 100 ml scir	1 FL	1 FL	SI		emetico		1 FL.	
LABETALOLO	vedi confezione	1	Labetalolo Salf (ex Trandate) mg.100 ml.20 f.ev	SI	5 fiale	SI	Solo a Novi la Rianimazione stocca 40 f. e l'Ostetricia-Ginecologia 50 f.	alfa-adrenergici		5 FIALE	
MAGNESIO SOLFATO (MgSO4)		1	Magnesio solfato 30g polv. Bustine	SI	SI	SI		catartico			
MANNITOLE 18% ml.250	tenere a temperatura ambiente perché a freddo cristallizza	2		SI	SI	SI		catartico		3-4 flac	
METILTIONINIO (BLU DI METILENE)		1	Blu di metilene 1% 100 mg fl. ml.10	SI	SI	SI		metaemoglobinemia		10 FIALE	SI
N-ACETILCISTEINA		2	Hidonac 5 g flc.	10	5	SI	NO	PARACETAMOLO, amanita, idrocarburi clorurati oppioidi		10 f in ogni DEA, 5 f nel PPI di Ovada	SI
NARCAN		1	Naloxone 0.4 mg fl	SI	SI	SI		curari, anticolinergici periferici		15 FIALE	
NEOSTIGMINA		1	Intrastigmina 500 mg fl	SI	SI	SI		ergotismo		10 FIALE	
NITROPRUSSATO DI SODIO		1	Sodio nitroprussiato 100 mg fl	SI	SI	SI					
OLIO DI VASELINA FU PER OS		1	ML.200	SI	SI	SI		antidoto aspecifico e universale delle sostanze liposolubili, in quanto non assorbito		2 FLAC	
MACROGOL (PEG) 4000 IN SOL. ELETTROLITICA		1	Moviprep polv. per soluz. orale in bustine 1 trattamento (attenzione: contiene acido ascorbico)	SI	SI	SI		catartico		1 CONFEZIONE	

PRINCIPIO ATTIVO	FRIGO: TC (temperatura di conservazione); SCADENZE	PRIORITA' secondo Risoluzione CEE 3 dic 1990	NOME COMMERCIALE	DEA	Punto di Primo Intervento (PPI) 1a Classe: OVADA	GUM TORTONA, FARMACIA ACQUI, FARMACIA CASALE	RIANIMAZIONE	SALA OPERATORIA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO / intossicazione da -	Quantitativi presenti obbligatoriamente nel sito di stoccaggio (escluso farmacia)	Emerg terrorismo
D-PENICILLAMINA (precedentem. Pemine): l'uso come antidoto nelle intossicazioni da piombo è, dal luglio 2011, ricompreso nell'elenco principale della legge 648/96 e pertanto quando lo dovesse usare, il clinico deve fare il monitoraggio clinico inviandone copia alla farmacia che effettua il monitoraggio economico trimestrale ad AIFA		3	D-PENICILLAMINA mg.150 cps confezioni da 50 cps	OSPEDALE DI TORTONA - in ogni caso è disponibile presso CAV					PIOMBO, rame, oro, mercurio, zinco	5 conf.= 250 cps	
PRALIDOSSIMA		2	Contrathion 200 mg fl	20 FIALE poi CAV	SI	SI			esteri organofosforici (insetticidi)	20 FLAC IN OGNI PRESIDIO POI CAV	si
PROTAMINA CLORIDRATO		1	Protamina 50 mg fl	SI	SI	SI			eparina	5 FIALE	
SIERO ANTIBOTULINICO	vedere confezione	3	Antitoxinum Botulinicum Polyvalent ABE fl Biomed	CAV	CAV				botulismo	disponibile presso CAV. e Ospedali Regionali	si
SIERO ANTIMALMIGNATTA	vedere confezione	3		CAV	CAV				puntura della malmignatta		
SIMETICONE		1	Mylicon gtt 30 ml	SI	SI	SI			antischiama	5 conf.	
SODIO BICARBONATO 8,4% ML.100		1	Bicarbonato di sodio 8.4% flc	SI	SI	SI			alcalinizzazione plasma e urine	25 FLAC	
Sodio polistirensulfonato	Kayexalate		Kayexalate 100 mg/g polvere per sospensione orale flac. 454 g	SI	NO				per il trattamento di iperkaliemia ed iperfosfatemia: KAYEXALATE 4.4- Avvertenze speciali e precauzioni di impiego - Alternative terapeutiche nell'iperpotassiemia grave: poiché per un efficace abbassamento del potassio sierico con KAYEXALATE possono essere necessarie ore o giorni, il trattamento con questo farmaco da solo può non bastare a correggere rapidamente una grave iperpotassiemia provocata da condizioni di rapida distruzione di tessuti, come esempio nelle ustioni e nell'insufficienza renale.	1 FLAC.	
SODIO TIOSOLFATO (IPOSOLFITO)		1	Sodio iposolfito 10% fl 10 ml	SI	SI	SI			cianuri, acido cianidrico	50 fiale per una terapia	si
SUCCIMER	TC max +25°C	3		CAV	CAV				Metalli	CAV	si
TERRA DI FULLER (BENTONITE IN SOSPENSIONE ACQUOSA AL 30%-PER SONDA ORALE) : LA TERRA DI FULLER PUO' ESSERE SOSTITUITA DAL CARBONE ATTIVATO. (FONTE: MARRUBINI, INTOSSICAZIONI ACUTE)		2	Terra di Fuller 30 g polv	QUESTO ANTIDOTO NON VIENE PIU' FORNITO DALLA DITTA: PRESENTE AD ACQUI, CASALE E NOVI FINO ALLA SCADENZA - REPERIBILE PRESSO CAV					paraquat (erbicida di contatto), diquat	30 flac. <u>Non In Vendita</u>	
Vitamina B1 (Tiamina)		2	Vitamina B1 mg.200 Salf 100 mg/ml - 2 ml	SI	SI				alcol etilico e glicol etilenico	10 f da 200 mg	
VIT. B6 (Piridossina)		2	Benadon 300 mg fl	SI	SI	SI			isoniazide, idrazina, crimidina, giromitrina	2 conf. da 6 fiale	
VITAMINA C (acido ascorbico)		1	Vitamina C Angelini 1 g/5 ml fl	SI	SI	SI			acidificazione urine, metaemoglobinemia (emoglobina con ferro ossidato)	30 fiale	
VITAMINA K (fitomenadione)	T.max.25°C	1	Konaktion 10 mg f sostituito da Konaktion 10 mg/ml soluz. orale e iniett. 3 fiale 1 ml	SI	SI	SI			anticoagulanti cumarinici	21 FIALE	
OSSIGENO		1							Monossido di carbonio (CO), cianuri, idrogeno solforato		
	Segue										
TRATTAMENTO DI EMERGENZA DELL' IPERPOTASSIEMIA (IPERKALIEMIA) Il trattamento di emergenza è necessario se la concentrazione sierica di potassio è superiore a 6,5 mmol / L.. - La procedura è la seguente: 1) Si deve somministrare 10 ml di calcio gluconato al 10% per via endovenosa per almeno due minuti per stabilizzare il muscolo cardiaco. Ripetere se necessario, in base all' ECG. 2) Abbassare rapidamente la potassiemia somministrando insulina solubile, ad esempio Actrapid in glucosio al 50 %. FONTE BIBL.: Longmore M, Wilkinson I. Rajagopalan S, eds. Oxford Handbook of Clinical Medicine, 6th edn. Oxford: Oxford University Press, 2004.											
SEGUE UBICAZIONE CENTRO ANTIVELENI DI PAVIA											

PRINCIPIO ATTIVO	FRIGO: TC (temperatura di conservazione); SCADENZE	PRIORITA' secondo Risoluzione CEE 3 dic 1990	NOME COMMERCIALE	DEA	Punto di Primo Intervento (PPI) 1a Classe: OVADA	GUM TORTONA, FARMACIA ACQUI, FARMACIA CASALE	RIANIMAZIONE	SALA OPERATORIA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO / intossicazione da -	Quantitativi presenti obbligatoriamente nel sito di stoccaggio (escluso farmacia)	Emerg terrorismo
CENTRO ANTIVELENI DI PAVIA via Salvatore Maugeri 10, 27100 Pavia											