


ANTIDOTI ASL AL

LE STRUTTURE DI STOCCAGGIO INDICATE SONO RESPONSABILI DEL MANTENIMENTO E DEL RINNOVO DELLE SCORTE CONCORDATE. SI RACCOMANDA DI CONTROLLARE LE SCADENZE MENSILMENTE. LE QUANTITA' INDICATE SONO QUELLE MINIME DA TENERE IN DOTAZIONE

CAV=CENTRO ANTIVELENI DI PAVIA	GLI ANTIDOTI DI PRIORITA' UNO DEVONO ESSERE PRESENTI SIA NEI DEA (Pronto Soccorso Tortona - Novi L. - Acqui T. - Casale M.) CHE NEI Punti di Primo Intervento (PPI) (Pronto Soccorso Ovada)				Centro Antiveleni di Pavia via Salvatore Maugeri 10, 27100 Pavia						
	FRIGO: TC (temperatura di conservazione); SCADENZE	PRIORITA' secondo Risoluzione CEE 3 dic 1990	NOME COMMERCIALE	DEA	Punto di Primo Intervento (PPI) 1a Classe: OVADA	GUM TORTONA, FARMACIA ACQUI, FARMACIA CASALE	RIANIMAZIONE	SALA OPERATORIA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO / intossicazione da -	Quantitativi presenti obbligatoriamente nel sito di stoccaggio (escluso farmacia)	Emerg terrorsi
ACIDO FOLICO/ FOLINICO		2	Sanifolin (calcio levofolinato pentaidrato) fl im ev 50 mg o Levofolene (calcio levofolinato pentaidrato) 25 mg flc.li.	NOVI (10 fiale) - CASALE (10 fiale)	NO	SI	NO	metotrexate, pirimetamina, metanolo	10 fiale solo NOVI - CASALE		
ALCOL ETILICO O ETANOLO (Alcool etilico sterile 95% fl)		1 (in quanto sostituisce fompizolo)	Etanolo 40-70% 10ml fl.: UTILIZZARE, DILUENDOLE, LE FIALE DI ETANOLO STER. 95% ML.10 - LE FIALE VENGONO FORNITE CON ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' DA PARTE DEL MEDICO RICHIEDENTE, NON ESSENDO REGISTRATE IN ITALIA	SI	SI	SI	NO	glicole etilenico, metanolo	60-80 f.		
AMIDO di frumento, di riso o di mais o di fecola di patate		1		SI	SI	SI	NO	iodio	500 g.		
ANTITOSSINA DEL VELENO DI VIPERA EUROPEA 500 j.a.: contiene IMMUNOGLOBULINA G EQUINA: ATTENZIONE: PERICOLO in caso di ALLERGIA, possibile SHOCK ANAFILATTICO: RIVOLGERSI SEMPRE PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE AL CENTRO ANTIVELENI	Il farmaco deve essere tenuto in frigorifero tra +2 e +8°C. Non congelare. Proteggere la fiala dalla luce tenendola nella sua scatola.	2	Immunoserum contra venena viperarum europaearum	2 fiale al DEA di Novi Ligure. Per bambini e adulti si usa una fiala da 500 j.a. La seconda fiala serve solo successivamente, se se ne richiede l'uso.				morso da vipera europea: l'uso è più appropriato in caso di forte intossicazione	2 fiale al DEA di Novi Ligure: la seconda fiala serve solo successivamente, se se ne richiede l'uso.		
ATROPINA 0,5 mg. - 1 mg f.		1	Atropina 0.5 - 1 mg fl.	SI	SI	SI	SI	carbamati, esteri organofosforici (insetticidi)	50 fiale	si	
BLU DI PRUSSIA (C.I. 77520)		3	Blu di Prussia 25 g polv.	CAV	NO		NO	tallio (metallo pesante)	CAV		
CALCIO CLORURO 10% da diluire		1	Calcio cloruro 10% 10 ml fl	SI	SI	SI	NO	acido fluoridrico, fluoruri, ossalati	10 fiale		
CALCIO EDETATO BISODICO G.1 ML.10, DA DILUIRE		2	Calcio Bisodico Edetato 10% fl, diluire in soluzione fisiologica 0,9% o glucosata 5% 500 ml	NOVI	NO	NO	NO	piombo	20 fiale		
CALCIO GLUCONATO da diluire		1	Calcio gluconato 10% 10 ml fl	SI	SI	SI	SI	acido fluoridrico, fluoruri, ossalati, POTASSIO (VEDI NOTA IN BASSO PER IPERPOTASSIEMIA)	almeno 10 fiale per DEA o PPI - DEVONO AVERLO TUTTI I REPARTI E AMBULATORI CHE UTILIZZANO IL POTASSIO CONCENTRATO	si	
CALCIUM GEL		2	Calcium gel (galenico) 250 ml tub: a base di Calcio Gluconato 2,5% + Lidocaina 2% POI alla scadenza solo CAV	CAV	NO	NO		ac fluoridrico, contatto cutaneo con ac. fluoridrico	CAV		

PRINCIPIO ATTIVO	FRIGO: TC (temperatura di conservazione); SCADENZE	PRIORITA' secondo Risoluzione CEE 3 dic 1990	NOME COMMERCIALE	DEA	Punto di Primo Intervento (PPI) 1a Classe: OVADA	GUM TORTONA, FARMACIA ACQUI, FARMACIA CASALE	RIANIMAZIONE	SALA OPERATORIA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO / intossicazione da -	Quantitativi presenti obbligatoriamente nel sito di stoccaggio (escluso farmacia)	Emerg terrorsi
CARBONE VEGETALE ATTIVATO IN POLVERE		1	Carbomix gr. 50 granuli oppure Carbone attivato polvere	SI	SI	SI			adsorbente	10 fl. Carbomix os granulato per sospensione 50 g oppure Carbone attivato 10 confezioni da g.50 (totale 500 g)	
CARTINE DI TORNASOLE (range pH 1-14)		1		SI	SI				per determinazione in urgenza delle soluzioni presunte caustiche/corrosive	N.1 confezione	
CIPROEPTADINA SCIROPPO		2	Periactin	SI	NO				Sindrome serotonergica	N.1 per DEA	
COLESTIRAMINA		3	Questran 4 g 12 buste per os	SI	SI	SI			digitossina	1 conf.	
DANTROLENE	Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.	1	Dantrium 20 mg fl	NO	NO	NO	36 fiale a Casale M	36 fiale sia ad Acqui T., sia a Novi L. che a Tortona	ipertermia maligna	36 fl.	
DEFEROXAMINA	T. infer. a +25°C	2	Desferal 500 mg f/c	NOVI (10 FIALE) - CASALE (10 FIALE)	SI	SI			ferro, alluminio	10 fiale	
DIAZEPAM	segue	1	Diazepam 10 mg fiale	SI	SI	SI			clorochina (anticonvulsivante)	30 fiale	si
DIMERCAPROLO	T.C. min +2°C max +25°C	2	B.A.L. 100 mg oppure da mg.200 (attualmente solo da mg.200) fl - FARMACO ESTERO	TENERE UNA CONFEZIONE POI CI SI RIVOLGE AL CENTRO ANTILENI PER IL PROSEGUIMENTO DELLA TERAPIA	NO				arsenico, oro, mercurio inorganico, piombo	UNA CONFEZ. PER DEA	si
DISULFIRAM		3	Etiltox mg.200 cp o Antabuse dispergettes mg.400 (24 cpr efferv.)	NOVI - CASALE	SI	SI			Nickel	2 conf. di Etiltox mg.200 oppure 1 confezione di Antabuse mg.400 sia A CASALE che a NOVI	
FAB ANTIDIGITALE antidigossina	T.C. da +2 a +8°C	1	Digifab mg.40 (1NOV19534) FARMACO ESTERO	2 F	1 F.				Digossina	2f per DEA e 1 f per PPI	
FISOSTIGMINA SALICILATO (ESERINA)		1	Anticholium 2 mg fl - FARMACO ESTERO	SI	SI	SI			ATROPINA e ANTICOLINERGICI (sindrome colinergica centrale)	5 fiale da mg.2	si
FLUMAZENIL	T.C.infer. a +30°C	1	Anexate 0,5 mg fl	SI	SI	SI			benzodiazepine	20 f. da 0,5 mg.	
	segue										

PRINCIPIO ATTIVO	FRIGO: TC (temperatura di conservazione); SCADENZE	PRIORITA' secondo Risoluzione CEE 3 dic 1990	NOME COMMERCIALE	DEA	Punto di Primo Intervento (PPI) 1a Classe: OVADA	GUM TORTONA, FARMACIA ACQUI, FARMACIA CASALE	RIANIMAZIONE	SALA OPERATORIA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO / intossicazione da -	Quantitativi presenti obbligatoriamente nel sito di stoccaggio (escluso farmacia)	Emerg terrismo
GLUCAGONE	T.C. da +2 a +8 °C	1	Glucagen 1 mg fl	3 fiale	30 fiale - non kit	3 fiale	30 fiale no kit: per l'avvelenamento da betabloccanti la quantità minima da utilizzare è di 100 fiale: quindi ove si presenti un caso, andranno recuperate tutte le fiale delle restanti Rianimazioni dell'ASL		insulina, Betabloccanti, Calcioantagonisti	3 FIALE in ogni DEA, 30 nel PPI di Ovada e 30 fiale in ogni Rianimazione	
GLUCOSIO IPERTONICO		1	Glucosio 33% fl.10 ml.	SI	SI	SI			coma ipoglicemico	50 FIALE	
IDROSSICOBALAMINA	T. max +25°C	1	CONFEZIONE di un flac. di Cyano-kit 5 g. (oppure CONFEZIONE di 2 flac. di Cyano-kit 2.5 g.) ATTENZIONE: il dosaggio da g.2,5 non è più prodotto	2 CONFEZIONI	1 CONFEZIONE				cianuri	2 confezioni per DEA ASL AL e 1 confezione per PPI	si
INSULINA SOLUBILE AD ES. ACTRAPID + SOLUZIONE GLUCOSIO AL 50% ml.500 in TUTTI I REPARTI E AMBULATORI CHE UTILIZZANO IL POTASSIO CONCENTRATO: il glucosio al 50% va tenuto a parte, possibilmente insieme al Potassio, per non confonderlo con il glucosio a minore concentrazione!				SI	SI	SI	SI		POTASSIO (VEDI NOTA IN BASSO PER IPERPOTASSIEMIA)	1 FLAC. ACTRAPID + n.X FLAC GLUCOSIO 50 % in TUTTI I REPARTI E AMBULATORI CHE UTILIZZANO IL POTASSIO CONCENTRATO	
IPECACUANA		1	Ipecacuana 7% 100 ml scir	1 FL	1 FL	SI			emetico	1 FL.	
LABELALOLO	vedi confezione	1	Labetalolo Salf (ex Trandate) mg.100 ml.20 f.ev	SI	5 fiale	SI	Solo a Novi la Rianimazione stocca 40 f. e l'Ostetricia-Ginecologia 50 f.		alfa-adrenergici	5 FIALE	
MAGNESIO SOLFATO (MgSO4)		1	Magnesio solfato 30g polv. Bustine	SI	SI	SI			catartico		
MANNITOLE 18% ml.250	tenere a temperatura ambiente perché a freddo cristallizza	2		SI	SI	SI			catartico	3-4 flac	
METILTIONINIO (BLU DI METILENE)		1	Blu di metilene 1% 100 mg fl. ml.10	SI	SI	SI			metaemoglobinemia	10 FIALE	SI
N-ACETILCISTEINA		2	Hidonac 5 g flc.	10	5	SI	NO		PARACETAMOLO, amanita, idrocarburi clorurati	10 f in ogni DEA, 5 f nel PPI di Ovada	SI
NARCAN		1	Naloxone 0.4 mg fl	SI	SI	SI			oppioidi	15 FIALE	
NEOSTIGMINA		1	Intrastigmina 500 mg fl	SI	SI	SI			curari, anticolinergici periferici	10 FIALE	
NITROPRUSSIATO DI SODIO		1	Sodio nitroprussiato 100 mg fl	SI	SI	SI			ergotismo	10 FIALE	
OLIO DI VASELINA FU PER OS		1	ML.200	SI	SI	SI			antidoto specifico e universale delle sostanze liposolubili, in quanto non assorbito	2 FLAC	
MACROGOL (PEG) 4000 IN SOL. ELETTROLITICA		1	Moviprep polv. per soluz. orale in bustine 1 trattamento (attenzione: contiene acido ascorbico)	SI	SI	SI			catartico	1 CONFEZIONE	

PRINCIPIO ATTIVO	FRIGO: TC (temperatura di conservazione); SCADENZE	PRIORITA' secondo Risoluzione CEE 3 dic 1990	NOME COMMERCIALE	DEA	Punto di Primo Intervento (PPI) 1a Classe: OVADA	GUM TORTONA, FARMACIA ACQUI, FARMACIA CASALE	RIANIMAZIONE	SALA OPERATORIA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO / intossicazione da -	Quantitativi presenti obbligatoriamente nel sito di stoccaggio (escluso farmacia)	Emergenze																																																																																																			
<p>TRATTAMENTO DI EMERGENZA DELL' IPERPOTASSIEMIA (IPERKALIEMIA) Il trattamento di emergenza è necessario se la concentrazione sierica di potassio è superiore a 6,5 mmol / L.. - La procedura è la seguente: 1) Si deve somministrare 10 ml di calcio gluconato al 10% per via endovenosa per almeno due minuti per stabilizzare il muscolo cardiaco. Ripetere se necessario, in base all' ECG. 2) Abbassare rapidamente la potassiemia somministrando insulina solubile, ad esempio Actrapid in glucosio al 50 %. FONTE BIBL.: Longmore M, Wilkinson I. Rajagopalan S, eds. Oxford Handbook of Clinical Medicine, 6th edn. Oxford: Oxford University Press, 2004.</p>																																																																																																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p data-bbox="206 316 772 327">La disponibilità degli antidoti è stata stabilita in base all'urgenza di impiego e il grado di priorità è stato codificato nel modo seguente:</p> <p data-bbox="250 331 772 391">1 = il farmaco deve essere disponibile entro 30 minuti (quindi presente in tutti i servizi di pronto soccorso) 2 = il farmaco deve essere disponibile entro 2 ore 3 = il farmaco deve essere disponibile entro 6 ore</p> <p data-bbox="206 391 929 438">Tale criterio, applicato con modifiche dal Centro Antivelelli di Pavia - Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, fa riferimento a quanto indicato dalla Risoluzione CEE del 3 dicembre 1990 (90/C 329/03) relativa al miglioramento della prevenzione e del trattamento delle intossicazioni acute nell'uomo (Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee, N. C 329/6 del 31.12.90)</p> <p data-bbox="280 438 504 454">CENTRO ANTIVELLELLI DI PAVIA</p> <table border="1" data-bbox="206 454 929 608"> <thead> <tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 50%; text-align: right;">  </div> </div>																																																																																																														