

























SEQUENZA RIMOZIONE DPI CON CAMICE CON DUE OPERATORI

Per la rimozione DPI è necessaria la presenza di un **II Operatore** che ha il compito di **compilare la check-list di RIMOZIONE** e **spruzzare il disinfettante** come di seguito indicato:

					
1. II Op. : prepara tutti i DPI su un ripiano pulito; ricopri il piano con un telo in TNT	2. II Op. : prepara Amuchina Spray e gel alcolico	3. II Op : prepara tappeti assorbenti in zona filtro e contenitore per rifiuti RSP-I	4. II Op. : <u>togli tutti i monili, gioielli, orologi</u>	5. II Op. : esegui accurata igiene mani con gel alcolico	6. II Op. : indossa camice e schermo facciale; procura check-list svestizione
					
7. II Op. : Esegui disinfezione con Amuchina Superfici Spray della parte frontale dell'operatore (grembiule), delle maniche e dei guanti (copri intere superfici del dorso e del palmo)	8. Togli il grembiule strappandolo sul collo, lasciando cadere la pettorina verso il basso e strappando l'allacciatura in vita.	9. Eliminalo nel contenitore per RSP-I	10. Rimuovi i guanti esterni (II° paio): - la parte esterna dei guanti è contaminata; afferra la parte esterna del guanto con la mano opposta guantata e rimuovilo - eliminalo nel contenitore per RSP-I	11. Fai scorrere le dita della mano priva del guanto appena rimosso sotto il polsino del guanto non ancora rimosso - sfila il guanto ed eliminalo nel contenitore per RSP-I	12. II Op. : Disinfetta con Amuchina Superfici Spray il I° paio di guanti

					
<p>13. Rimuovi lo schermo facciale afferrando l'elastico sul retro del capo</p>	<p>14. Elimina lo schermo facciale nel contenitore per RSP-I</p>	<p>15. Rimuovi il copricapo a mantellina afferrandolo sulla sommità</p>	<p>16. Elimina il copricapo nel contenitore per RSP-I</p>	<p>17. Rimuovi il camice: - slega i lacci sul fianco Ricorda: la parte anteriore e le maniche sono contaminate; manipola solo la parte interna/posteriore del camice</p>	<p>18. Allontana e sfila la parte del collo e delle spalle</p>
					
<p>19. Rivolta il camice</p>	<p>20. Arrotola il camice su stesso ed eliminalo nel contenitore per RSP-I</p>	<p>21. II Op: disinfetta con Amuchina Superfici Spray il I° paio di guanti</p>	<p>22. Rimuovi il filtrante facciale afferrando gli elastici sul retro del capo</p>	<p>23. Eliminalo nel contenitore per RSP-I.</p>	<p>24. Rimuovi la cuffia ad elastico</p>

					
<p>25. Sfila i calzari toccandoli solo dall'esterno (è possibile sedersi). Eliminali nel contenitore per RSP-I</p>	<p>26. II Op: disinfetta con Amuchina Superfici Spray il 1° paio di guanti</p>	<p>27. II Op: disinfetta con Amuchina Superfici Spray la suola delle calzature</p>	<p>28. Esci dal tappeto assorbente</p>	<p>29. Rimuovi i guanti interni (1° paio). - la parte esterna dei guanti è contaminata; afferra la parte esterna del guanto con la mano opposta guantata e rimuovilo - eliminalo nel contenitore per RSP-I</p>	<p>30. Fai scorrere le dita della mano non guantata sotto il polsino del guanto non ancora rimosso - sfila il guanto ed eliminalo nel contenitore per RSP-I</p>
					
<p>31. Esegui l'igiene mani con un lavaggio antisettico</p>	<p>32. Esegui frizione alcolica dopo aver asciugato accuratamente le mani</p>	<p>33. Il primo operatore indossa nuovamente il camice impermeabile e un paio di guanti ed elimina tutti i DPI e i dispositivi medici utilizzati</p>	<p>34. Il primo operatore esegue la disinfezione delle superfici contaminate (Amuchina Spray).</p>	<p>35. II Op: rimuovi camice e guanti (vedi punti 17 – 18 – 19 – 20 - 29 e 30)</p>	<p>36. II Op: effettua un'igiene mani completa (vedi punto 31 e 32).</p>

Al termine eliminare la divisa nel sacco rosso e cambiarla.