PROCEDURA GENERALE

**GESTIONE SINDROME INFLUENZALE:
PERCORSO E MISURE DI PROTEZIONE**

P.O. NOVI LIGURE

GESTIONE SINDROME INFLUENZALE: PERCORSO E MISURE DI PROTEZIONE P.O. NOVI LIGURE	SETTEMBRE 2009 Codice: AL.RCRI.009.2009.00
--	--	--

REDAZIONE			data	firma
	Dott.ssa D. Balestrino	SOC RISCHIO INFETTIVO ASLAL	SETTEMBRE 2009	
	Dott.ssa L. Bisogni	ICI RISCHIO INFETTIVO	SETTEMBRE 2009	

EMISSIONE				

APPROVAZIONE				

AGGIORNAMENTI E REVISIONI DEL DOCUMENTO
--

Rev.	Par.	Pag.	Descrizione	Data

INDICE

Definizioni	pag. 4
1. Scopo procedura	pag. 6
2. Area di applicazione	pag. 6
3. Generalità	
3.1 agente eziologico	pag. 6
3.2 serbatoio	pag. 6
3.3 definizione di caso	pag. 6
3.4 modalità di trasmissione	pag. 7
3.5 periodo di incubazione	pag. 8
3.6 periodo di contagiosità	pag. 8
4. Criteri di ospedalizzazione	
4.1 nell'adulto	pag. 8
4.2 nel bambino	pag. 9
5. Definizione delle responsabilità	pag. 10
5.1 Notifica	pag. 10
6. Descrizione delle attività	
6.1 Trasporto del paziente in ospedale	pag. 11
6.2 Gestione del caso in triage	pag. 11
7. Misure di riduzione del rischio di trasmissione	
7.1 Misure da far adottare al paziente	pag. 14
7.2 Misure per gli operatori durante assistenza al paziente	pag. 14
7.3 Camera di isolamento presso il DEA/PS	pag. 15
7.4 Assistenza al paziente in isolamento	pag. 16
7.5 Pulizia dell'ambiente	pag. 17
7.6 Trasporto del paziente all'interno dell'ospedale	pag. 17
7.7 Dimissione/trasferimento presso altra Struttura	pag. 18
7.8 Dopo la dimissione del paziente	pag. 18
8. Comportamenti da adottare per la gestione delle ambulanze	
8.1 Modalità di trasporto di casi affetti da ILI	pag. 19
8.2 Trasporto del paziente	pag. 19
8.3 Comportamenti da adottare dopo consegna del paziente	pag. 20
8.4 Trattamento del mezzo di trasporto e delle attrezzature	pag. 20
9. Gestione di caso che accede direttamente ad Amb. o Servizio	pag. 21
10. Ricovero in Reparto	pag. 22
11. Verifica applicazione procedura	pag. 23
Documenti correlati	pag. 24
Bibliografia	pag. 24
Allegato 1 Precauzioni standard	pag. 25
Allegato 2 Precauzioni aggiuntive	pag. 26
Allegato 3 Procedura vestizione/vestizione	pag. 26
Allegato 4 Scheda notifica	pag. 27
Allegato 5 Foglio informativo	pag. 28
Allegato 6 Gestione attrezzature e materiali	pag. 29
Allegato 7 Schema OMS – Lavaggio mani	pag. 30
Allegato 8 Schema OMS – Decontaminazione mani	pag. 31
Allegato 9 Schema OMS – Vestizione	pag. 32
Allegato 10 Schema OMS – Svestizione	pag. 33

GESTIONE SINDROME INFLUENZALE: PERCORSO E MISURE DI PROTEZIONE P.O. NOVI LIGURE	SETTEMBRE 2009 Codice: AL.RCRI.009.2009.00
--	--	--

DEFINIZIONI

Caso clinico: persona che presenta i segni ed i sintomi della malattia oggetto dello studio.

Contatto: persona che ha avuto un contatto stretto con un paziente contagioso per un tempo sufficiente a rendere probabile la trasmissione dell'agente infettivo.

Contatto stretto: quello che intercorre tra persone che vivono o lavorano insieme nello stesso ambiente o tra un malato e chi lo accudisce.

Clinical Box: contenitore deputato al trasposto dei RSP-I (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo) costituito da un contenitore interno a sacco in PVC, impermeabile e con chiusura a laccio e da un involucro esterno in cartone o materiale plastico rigido con stampigliata la dicitura «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo di rischio biologico.

DPI: dispositivo di protezione individuale. E' tale qualsiasi dispositivo, indossato dal lavoratore durante la propria prestazione d'opera, atto a proteggerlo dall'esposizione a rischi lavorativi (biologici, chimici, fisici, ecc.).

ILI : influenza like illness – sindrome simil influenzale

Precauzioni standard: alla luce delle indicazioni del CDC del 1996 sono tali tutte le misure protettive a carattere generale che l'operatore sanitario deve mettere in atto sempre, indipendentemente dalle caratteristiche del paziente che sta assistendo (es. lavaggio mani, uso dei guanti, ecc) (allegato 1)

Precauzioni Aggiuntive: alla luce delle indicazioni del CDC del 1996, sono precauzioni da applicare, in aggiunta alle precauzioni standard, in relazione alla via di trasmissione dell'agente eziologico della malattia infettiva o sospetta tale. Esse riguardano la trasmissione aerea, da droplet e da contatto.(allegato 2)

<p>ASL REGIONE PIEMONTE</p>	<p>GESTIONE SINDROME INFLUENZALE: PERCORSO E MISURE DI PROTEZIONE P.O. NOVI LIGURE</p>	<p>SETTEMBRE 2009</p> <p>Codice: AL.RCRI.009.2009.00</p>
--	---	--

RSP-I: Rifiuti Sanitari pericolosi a rischio infettivo.

SISP: Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Stanza isolamento: stanza singola con bagno e filtro, con areazione o possibilmente pressione negativa.

Triage: metodo con il quale si effettua la scelta e l'assegnazione di priorità assistenziali ai pazienti di un'area critica intesa sia come zona in cui si è verificato un disastro o una calamità, sia come area di accoglienza di un Pronto Soccorso.

UPRI: Unità Operativa Prevenzione Rischio Infettivo

GESTIONE SINDROME INFLUENZALE: PERCORSO E MISURE DI PROTEZIONE P.O. NOVI LIGURE	SETTEMBRE 2009 Codice: AL.RCRI.009.2009.00
--	--	--

1. SCOPO DELLA PROCEDURA

Fornire agli operatori indicazioni relative agli interventi efficaci e sicuri per la gestione del paziente con sindrome influenzale.

2. AREA DI APPLICAZIONE

La seguente procedura va osservata e applicata in tutte le situazioni in cui si presentino persone con sindrome influenzale, per cui vi è rischio di esposizione ad agenti infettivi.

3. GENERALITA'

L'influenza è una malattia provocata dai virus influenzali, che colpisce prevalentemente le vie respiratorie. Solitamente la malattia dura circa una settimana e si risolve con la guarigione. In alcuni casi possono verificarsi complicanze causate da sovra infezioni batteriche a carico di apparati diversi come polmonite, sinusite e otite (queste ultime soprattutto nei bambini), disidratazione e dal peggioramento di malattie preesistenti (ad esempio malattie croniche dell'apparato cardiovascolare, respiratorio, renale, ecc).

L'influenza costituisce un importante problema di Sanità Pubblica a causa della ubiquità, contagiosità, variabilità antigenica dei virus influenzali, dell'esistenza di serbatoi animali e delle possibili gravi complicanze. Frequente motivo di consultazione medica e di ricovero ospedaliero, e in Italia per patologia infettiva, preceduta solo da AIDS e tubercolosi.

3.1 Agente eziologico: virus influenzale tipo A,B,C¹

3.2 Serbatoio: L'uomo è il serbatoio principale delle infezioni umane.

3.3 Definizione di caso: La definizione di caso è clinica e individua le sindromi simil influenzali (ILI – influenza like illness).

I sintomi dell'influenza sono comuni a molte altre malattie, per cui dal punto di vista clinico, l'influenza viene definita come un'affezione respiratoria ad esordio acuto, brusco

¹ **Influenza A/H1N1** Integrare con le note e gli aggiornamenti via via trasmessi per gli accertamenti diagnostici, la sorveglianza, la profilassi e il trattamento

GESTIONE SINDROME INFLUENZALE: PERCORSO E MISURE DI PROTEZIONE P.O. NOVI LIGURE	SETTEMBRE 2009 Codice: AL.RCRI.009.2009.00
--	--	--

ed improvviso con febbre $\geq 38^{\circ}\text{C}$, accompagnata da almeno uno tra i seguenti sintomi sistemici:

- cefalea,
- malessere generalizzato,
- sensazione di febbre (sudorazione brividi)
- astenia,

e da almeno uno dei seguenti sintomi respiratori:

- tosse,
- faringodinia,
- congestione nasale.

Per la diagnosi di influenza nel bambino è importante considerare quanto indicato per gli adulti tenendo conto che:

1. i bambini più piccoli non sono in grado di gestire la sintomatologia sistemica che invece si può manifestare con:
 - irritabilità
 - pianto
 - inappetenza
2. nel lattante l'influenza è accompagnata da vomito e diarrea e solo eccezionalmente da febbre;
3. occhi arrossati e congiuntivite sono caratteristici dell'influenza nei bambini in età prescolare in caso di febbre elevata;
4. nel bambino di 1 - 5 anni la sindrome influenzale si associa frequentemente a laringotracheite e bronchite e a febbre elevata.

3.4 Modalità di trasmissione: L'infezione si trasmette per droplet, le goccioline di saliva di diametro superiore a 5 micron che si propagano a breve distanza (1 - 1,5 m.), emesse con la tosse, lo starnuto o anche semplicemente parlando. I virus dell'influenza, che resistono molto bene nell'ambiente esterno in situazioni di bassa temperatura ed umidità, si diffondono facilmente negli ambienti affollati.

GESTIONE SINDROME INFLUENZALE: PERCORSO E MISURE DI PROTEZIONE P.O. NOVI LIGURE	SETTEMBRE 2009 Codice: AL.RCRI.009.2009.00
--	--	--

3.5 Periodo di incubazione: Il periodo di incubazione dell'influenza è di 1- 4 giorni (in media 2).

3.6 Periodo di contagiosità :

Il periodo di contagiosità comincia un po' prima che si manifestino i primi sintomi e si prolunga per 5-7 giorni; il periodo di contagiosità nei bambini può essere più lungo che negli adulti.

4. CRITERI DI OSPEDALIZZAZIONE

4.1 Nell'adulto:

Quando il decorso clinico dell'influenza è complicato si raccomanda di considerare i seguenti fattori di rischio per un eventuale ricovero ospedaliero. Tali fattori, se multipli e correlati allo stato clinico o socioeconomico del paziente, aumentano il rischio di complicanze e mortalità; in ogni caso, non si può prescindere dal giudizio clinico globale del medico.

- Donna gravida
- Soggetti di età maggiore o uguale a 65 anni

Criteri clinici

- presenza di malattie concomitanti: malattie croniche respiratorie, cardiache, renali, epatiche, tumori, diabete mellito, abuso cronico di alcool, malnutrizione, malattie cerebrovascolari, postsplenectomia, ospedalizzazione nell'ultimo anno;
- frequenza respiratoria 30 atti/minuto; pressione diastolica 60mmHg o pressione sistolica < 90mmHg; polso 125/min; temperatura corporea < 35° o 40° C; variazioni dello stato mentale (disorientamento, stupore), evidenza di siti extrapolmonari di infezione.

Dati di laboratorio

- globuli bianchi < 4.000/ml o > 30.000/ml o numero assoluto di neutrofili < 1.000/ml;
- PaO₂ < 60mmHg o PaCO₂ > 50mmHg;
- evidenza di alterata funzionalità renale: creatinina > 1,2mg/dl;
- evoluzione radiografica sfavorevole e/o polmonite con focolai multipli, presenza di cavitazione o versamento pleurico;

GESTIONE SINDROME INFLUENZALE: PERCORSO E MISURE DI PROTEZIONE P.O. NOVI LIGURE	SETTEMBRE 2009 Codice: AL.RCRI.009.2009.00
--	--	--

- ematocrito < 30% o emoglobina < 9g/dl;
- evidenza di sepsi o di segni di danno d'organo come l'acidosi metabolica o alterazioni della coagulazione;
- pH arterioso < 7,35.

Il ricovero è raccomandato nel caso di pazienti che pur con un quadro clinico meno compromesso di quello indicato nella raccomandazione precedente, presentino condizioni economiche e sociali disagiate non supportate da una rete di assistenza socio-sanitaria adeguata alternativa al ricovero.

4.2 Nel bambino:

Non ci sono indicazioni assolute al ricovero solo in base all'età. Non si richiede necessariamente il ricovero, ma la gestione a livello domiciliare o ambulatoriale da parte del pediatra, quando si è in presenza dei segni o sintomi indicati nell'elenco che segue:

- disidratazione correggibile per via orale;
- basso peso neonatale o prematurità in soggetto di età > 3 mesi;
- lieve distress respiratorio.

Il ricovero ospedaliero del bambino affetto da sindrome influenzale va considerato ma non necessariamente effettuato nei seguenti casi:

- incapacità della famiglia di gestire il problema
- assenza di condizioni economiche o sociali che garantiscano l'assistenza a domicilio
- episodi di convulsioni febbrili successivi al primo e non complicate (cessate all'arrivo in ospedale)
- frequenza respiratoria > 60/min o saturazione O₂ < 92% (NB: la frequenza respiratoria varia con l'età) o se è affetto da una delle seguenti patologie croniche, in base alle condizioni cliniche del singolo paziente (particolarmente in bambini con età < 3 mesi):
 - Asma (pz. che necessitano di terapia giornaliera con corticosteroidi o broncodilatatori o cromoni o antileucotrieni)
 - Malattie polmonari croniche (es. fibrosi cistica)
 - Cardiopatie
 - Immunosoppressione (pz con storia di patologie neoplastiche, vasculiti e collagenopatie, immunodeficienze congenite o acquisite o terapia immunosoppressiva > 2 settimane)
 - Emoglobinopatie

GESTIONE SINDROME INFLUENZALE: PERCORSO E MISURE DI PROTEZIONE P.O. NOVI LIGURE	SETTEMBRE 2009 Codice: AL.RCRI.009.2009.00
--	--	--

- Disfunzioni renali croniche
- Diabete mellito
- Difetti congeniti del metabolismo
- Terapia di lunga durata con salicilati (es. ARI, S. Kawasaki)
- Patologie neurologiche e neuro-muscolari che ostacolano le funzione respiratoria

Il ricovero ospedaliero del bambino affetto da sindrome influenzale è fortemente raccomandato soprattutto se il bambino presenta sintomi quali:

- Insufficienza respiratoria e segni di distress respiratorio
- Presenza di cianosi (di origine respiratoria o cardiaca)
- Riconcontro di FR > 70/min o Saturazione di O₂ < 90%
- Disidratazione grave
- Convulsioni (primo episodio) o sintomi neurologici
- Bronchiolite < 3 mesi
- Alterazioni dello stato di coscienza*
- Segni di setticemia (almeno due tra pallore, ipotonia, ipotensione)*
- Cardiopatie cianogene [incluse nella versione PNLG 2001]

5. DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

L'applicazione della procedura e l'adozione delle misure precauzionali descritte nel presente documento deve avvenire in maniera sistematica da parte di tutto il personale sanitario, nel rispetto delle specifiche competenze professionali ed in relazione alle singole attività descritte nel documento.

5.1 Notifica

Si raccomanda di compilare in ogni sua parte la scheda di notifica (allegato 4), seguendo le consuete procedure di segnalazione delle malattie infettive.

GESTIONE SINDROME INFLUENZALE: PERCORSO E MISURE DI PROTEZIONE P.O. NOVI LIGURE	SETTEMBRE 2009 Codice: AL.RCRI.009.2009.00
--	--	--

6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

6.1 Trasporto del paziente in ospedale

Se si realizzasse la necessità dell'ospedalizzazione del paziente, il personale addetto al trasporto dovrà essere avvisato del caso di ILI e informato delle precauzioni necessarie (standard più quelle specifiche per trasmissione tramite goccioline):

- far indossare al paziente una mascherina chirurgica;
- indossare mascherina chirurgica;
- indossare camice tnt;
- indossare guanti monouso;
- indossare occhiali o visiera protettiva se il paziente tossisce e non sopporta la mascherina chirurgica.

Inoltre il MMG o il Servizio di continuità assistenziale dovrà avvisare il personale di triage al n° 0143/332315

Si ricorda che, se possibile, una misura preventiva utile per tutte le malattie trasmissibili per via respiratoria è quella di favorire nel mezzo la circolazione dell'aria (finestrino o posteriore leggermente aperto).

Come per tutte le malattie trasmissibili per goccioline e/o via aeree è necessario utilizzare un mezzo con separazione fra l'abitacolo di guida e la cabina con il paziente. Il finestrino fra cabina di guida e cabina posteriore deve essere chiuso prima che il paziente salga a bordo. Non deve essere attivato il "ricircolo" dell'impianto di ventilazione o di condizionamento dell'aria.

6.2 Gestione del caso in triage

In caso di presenza di sindrome simil influenzale gli operatori devono:

- Indossare i DPI di protezione standard e aggiuntivi per trasmissione via droplet (allegati 1,2,3).
- Accompagnare immediatamente il paziente nel locale dedicato (sala visita n°3)

Al fine di evitare la permanenza di potenziali fonti di contagio in locali comuni (sale di attesa, ambulatori) a contatto con soggetti recettivi, e al fine di codificare gli spostamenti dell'utente all'interno delle strutture ospedaliere, si rende necessario adottare i seguenti comportamenti:

GESTIONE SINDROME INFLUENZALE: PERCORSO E MISURE DI PROTEZIONE P.O. NOVI LIGURE	SETTEMBRE 2009 Codice: AL.RCRI.009.2009.00
--	--	--

- gli utenti che giungono al DEA /PS con sindrome simil – influenzale (ILI) devono essere invitati dal personale del TRIAGE a indossare mascherina chirurgica, consegnare al paziente foglio informativo (allegato n. 5) con le indicazioni delle precauzioni da adottare durante la permanenza. Compatibilmente con le urgenze presenti, si raccomanda di ridurre i tempi di attesa del paziente nelle aree comuni. Nel caso della contemporanea presenza di più casi, si raccomanda di utilizzare per tutti la stessa sala visite **n.° 3** dove saranno sottoposti a valutazioni e accertamenti che il caso richiede.
- la sala visita 3 , terminata la visita, dovrà essere areata ,si dovrà provvedere alla pulizia e disinfezione degli arredi utilizzati (barella, aste e supporti per fleboclisi ecc.) e pulizia e disinfezione/ sterilizzazione dei presidi utilizzati (allegato 6)
- Il locale individuato per l'osservazione nel DEA di Novi Ligure è la prima camera di degenza dell'astanteria (**camera di isolamento 1**). Durante il transito al DEA e per tutto il periodo di permanenza in tale locale, il paziente deve indossare la mascherina chirurgica, se tollerata.

6.2.1 Fase di accettazione e Triage

(*) Nel bambino è importante considerare che:
nel lattante spesso vomito e diarrea , eccezionalmente febbre; nei bambini più piccoli: irritabilità, pianto, inappetenza, in età prescolare: occhi arrossati e congiuntivite se febbre elevata; tra 1-5 anni: frequenti laringotracheite, bronchite e febbre elevata.

<p align="center">GESTIONE SINDROME INFLUENZALE: PERCORSO E MISURE DI PROTEZIONE P.O. NOVI LIGURE</p>	<p align="right">SETTEMBRE 2009</p> <p align="right">Codice: AL.RCRI.009.2009.00</p>
--	--	--

7. MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO DI TRASMISSIONE

La trasmissione interumana del virus dell'influenza si può verificare per via aerea attraverso droplet, ma anche per contatto con mani contaminate dalle secrezioni respiratorie; pertanto la protezione con DPI nonché la corretta igiene delle mani è essenziale per limitare la diffusione dell'influenza.

7.1 Misure da far adottare al paziente

Far adottare al paziente con sintomatologia influenzale le seguenti misure di protezione personale:

- ✓ uso di mascherina chirurgica che copra bocca e naso
- ✓ igiene respiratoria, coprendo bocca e naso con la mano o con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce (i fazzoletti in tessuto devono essere usati una sola volta)
- ✓ igiene delle mani con acqua e detergente o con gel idroalcolico in particolare dopo essersi soffiati il naso o aver tossito o starnutito
- ✓ smaltimento immediato dei fazzoletti monouso utilizzati negli appositi contenitori (clinical box)

7.2 Misure per gli operatori durante l'assistenza al paziente

Gli operatori sanitari a stretto contatto con il caso (compresi i Tecnici di Radiologia) devono:

- ✓ durante le procedure standard indossare i seguenti DPI: mascherina chirurgica, guanti, camici tnt
- ✓ in caso di procedure che possono generare aerosol indossare i seguenti DPI: facciale filtrante P2, guanti, camici tnt e occhiali
- ✓ smaltire i DPI usati come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
- ✓ praticare igiene delle mani con acqua e detergente o con gel idroalcolico prima e dopo contatto con il paziente, dopo contatto con materiale biologico e dopo la rimozione dei guanti

GESTIONE SINDROME INFLUENZALE: PERCORSO E MISURE DI PROTEZIONE P.O. NOVI LIGURE	SETTEMBRE 2009 Codice: AL.RCRI.009.2009.00
--	--	--

7.3 Camera di isolamento presso il DEA/P.S.

La camera di isolamento presso il DEA deve essere allestita secondo quanto indicato in Tabella 1. Seguire le raccomandazioni dell'allegato 3.

Tabella 1

a) all'esterno della camera:

- Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine chirurgiche, facciale filtrante FFP2 FFP3, visiere di protezione, guanti, camice in tnt, cuffia).
- Soluzione gel alcoolica per igiene mani
- Clinical box.
- Sulla porta deve essere affisso il cartello "ACCESSO CONTROLLATO"

b) camera di degenza:

- Prediligere l'utilizzo di materiale monouso e, laddove non possibile, limitare la scelta ad articoli per i quali è possibile, in accordo con le indicazioni del produttore, un trattamento di disinfezione e/o di sterilizzazione.
- Soluzione gel alcolico per igiene mani
- Clinical box
- Contenitore rigido per aghi e taglienti.
- Farmaci d'urgenza.
- Materiale sanitario (agh, siringhe, aghi cannula, deflussori ecc.).
- Materiale per l'assistenza personalizzato (fonendoscopio, sfigmomanometro, termometro ecc.).
- Contenitore con sacco per biancheria sporca.

N.B: La documentazione relativa al paziente deve rimanere al di fuori della camera di degenza.

c) servizi igienici:

- Materiale igienico monouso (sapone antiseptico, asciugamani monouso, copriwc monouso ecc.)
- Clinical box

<p>ASL REGIONE PIEMONTE</p>	<p>GESTIONE SINDROME INFLUENZALE: PERCORSO E MISURE DI PROTEZIONE P.O. NOVI LIGURE</p>	<p>SETTEMBRE 2009</p> <p>Codice: AL.RCRI.009.2009.00</p>
--	---	--

7.4 Assistenza al paziente in isolamento

- Limitare al massimo i contatti del paziente con l'esterno
- Il paziente posto in isolamento deve stare nella sua stanza con la porta chiusa.
- Il paziente deve indossare una mascherina chirurgica anche in stanza se tossisce in presenza di altre persone.
- Informare ed istruire il paziente collaborante sulla necessità di provvedere ad un'azione di igiene delle mani, sempre, dopo il contatto con le secrezioni respiratorie (tosse, starnuto)
- Identificare un numero minimo di operatori dedicati all'assistenza al paziente in isolamento respiratorio
- Consentire l'accesso ai locali di isolamento solo a personale autorizzato; vietare l'accesso a parenti e accompagnatori.
- Prima di entrare nella camera di isolamento indossare i DPI (allegati 1,2,3)
- Adottare, durante la visita e le manovre assistenziali, oltre alle precauzioni standard, misure di prevenzione aggiuntive (allegati 1,2)
- Evitare di contaminare l'ambiente (toccare le superfici ambientali con le mani e/o i guanti potenzialmente contaminati che hanno avuto contatto con il paziente o con l'ambiente circostante il paziente) ed evitare di toccarsi bocca, naso, occhi durante le manovre assistenziali.
- Nel caso di ricovero in Pediatria si raccomanda agli operatori di fornire, a chi permane in camera con il bambino, tutte le informazioni necessarie per limitare la diffusione del virus e sulle misure di protezione da adottare (DPI, igiene mani e norme comportamentali)

GESTIONE SINDROME INFLUENZALE: PERCORSO E MISURE DI PROTEZIONE P.O. NOVI LIGURE	SETTEMBRE 2009 Codice: AL.RCRI.009.2009.00
--	--	--

7.4.1 Prima di uscire dalla camera di isolamento:

- Rimuovere i DPI utilizzati (con esclusione della visiera di protezione) e smaltirli nel clinical box
- Eseguire lavaggio delle mani con soluzione antisettica (PVP Iodio 7,5% o Clorexidina gluconato 4%) o frizionare le mani con soluzione alcoolica.

7.4.2 All'uscita dalla camera di isolamento:

- Rimuovere la visiera di protezione e la mascherina chirurgica e smaltire la mascherina nel clinical box
- Pulire e disinfettare la visiera
- Eseguire lavaggio delle mani con soluzione antisettica (PVP Iodio 7,5% o Clorexidina gluconato 4%) o frizionare le mani con soluzione alcoolica.

7.5 Pulizia dell'ambiente

E' raccomandata l'individuazione dello stesso operatore

Il personale coinvolto nelle attività di pulizia e disinfezione deve osservare l'adozione delle misure di protezione individuale (DPI) per le Precauzioni Standard e aggiuntive (Allegati 1,2,3,6)

Quando il paziente è stato trasferito e dimesso ritardare l'avvio delle procedure di pulizia terminale in modo da consentire al sistema di ventilazione di rimuovere le particelle virali aerodisperse.

7.6 Trasporto del paziente all'interno dell'ospedale

Il paziente deve essere trasportato fuori dalla stanza per procedure diagnostiche e/o terapeutiche solo quando non è possibile fare altrimenti; il tempo di soggiorno fuori dalla stanza deve essere ridotto al minimo. Limitare gli spostamenti del paziente dalla stanza, soprattutto nel caso di consulenza specialistica.

Se lo spostamento ed il trasporto sono indispensabili è necessario:

- Far indossare al paziente una mascherina chirurgica (se le condizioni di funzionalità respiratoria lo consentono).

GESTIONE SINDROME INFLUENZALE: PERCORSO E MISURE DI PROTEZIONE P.O. NOVI LIGURE	SETTEMBRE 2009 Codice: AL.RCRI.009.2009.00
--	--	--

- Informare preventivamente del rischio infettivo gli addetti al trasporto e il personale della struttura presso la quale il paziente viene inviato.
- Evitare di far sostare il paziente, in caso di esecuzione di esami diagnostici, in zone d'attesa o di transito, a contatto con altri utenti e/o personale sanitario; in caso di necessità di radiografie preferire l'esecuzione con apparato portatile.

7.7 Dimissione/trasferimento presso altra struttura (ospedale, RSA)

L' Operatore del DEA avverte il personale di soccorso della presenza del paziente con malattia infettiva, dà indicazioni chiare e precise sulle modalità di trasmissione e sui DPI da adottare durante il trasporto, provvedendo alla fornitura dei DPI per un uso sufficiente.

7.8 Dopo la dimissione del paziente:

- Prima di accedere alla camera di isolamento indossare i DPI
- Aerare l'ambiente aprendo le finestre della stanza e tenendo la porta della camera chiusa
- Eliminare i rifiuti e il materiale monouso utilizzato nel clinical box
- Sigillare il contenitore stesso e provvedere allo stoccaggio nel luogo di raccolta.
- Smaltire la biancheria utilizzata in sacco impermeabile, chiudere ermeticamente e inviare al lavaggio.
- Pulire e disinfettare/sterilizzare i presidi sanitari riutilizzabili (sfigmomanometro, fonendoscopio, termometro,.ecc.). (allegato 6)
- Pulire accuratamente tutte le superfici orizzontali e verticali (pavimenti, pareti, porte, letti, piani d'appoggio, ecc.) dei servizi igienici, della camera; far seguire alla pulizia le operazioni di disinfezione (sodio dicloroisocianurato compresse, 3 cp in 5 litri di acqua).
- Rimuovere i DPI utilizzati e smaltirli nel clinical box.
- Lavare e disinfettare i DPI riutilizzabili (visiera di protezione).
- Eseguire lavaggio delle mani con soluzione antisettica

<p align="center">GESTIONE SINDROME INFLUENZALE: PERCORSO E MISURE DI PROTEZIONE P.O. NOVI LIGURE</p>	<p align="right">SETTEMBRE 2009</p> <p align="right">Codice: AL.RCRI.009.2009.00</p>
--	--	--

8. COMPORTAMENTI DA ADOTTARE PER LA GESTIONE DELLE AMBULANZE IN ACCORDO CON PROTOCOLLI SEST 118.

8.1 Modalità di trasporto di casi affetti da ILI – considerazioni generali:

I casi di ILI dovranno essere trasportati impiegando un numero minimo di operatori su veicoli privi di altri pazienti o passeggeri.

I centri di accettazione/accoglienza dovranno essere informati prima dell'arrivo di casi sospetti al fine di predisporre le idonee misure e procedure di controllo dell'infezione (preparazioni degli ambienti).

Per il trasporto preferire veicoli che hanno il sistema di ventilazione della cabina autisti separata dal vano sanitario dell'ambulanza.

Adozione delle misure di barriera presso il locale dove si trova il paziente

Gli operatori, prima di venire in contatto con il paziente, devono indossare i DPI (allegati 1,2,3).

Al paziente deve essere immediatamente consegnata e fatta indossare una mascherina chirurgica che copra bene sia il naso che la bocca, se le condizioni cliniche lo consentono.

8.2 Trasporto del paziente

Prima dell'ingresso del paziente a bordo chiudere qualsiasi comunicazione tra abitacolo che ospita il paziente e cabina dell'autista. Non attivare il ricircolo dell'impianto di ventilazione o di condizionamento dell'aria per tutta la durata del viaggio compreso il ritorno in sede. Inoltre può essere opportuno creare una debole pressione negativa nella cabina posteriore. Il sistema più semplice per ottenere tale risultato è quello di mantenere aperto il finestrino della cabina di guida.

GESTIONE SINDROME INFLUENZALE: PERCORSO E MISURE DI PROTEZIONE P.O. NOVI LIGURE	SETTEMBRE 2009 Codice: AL.RCRI.009.2009.00
--	--	--

8.3 Comportamenti da adottare dopo la consegna del paziente

Qualora il paziente non avesse adottato la mascherina di protezione gli operatori dell'ambulanza tornano in sede continuando a indossare i DPI. In sede gli operatori rimuovono i DPI (allegato 3). Questa misura non si rende necessaria quando il paziente ha indossato correttamente la mascherina chirurgica.

I DPI utilizzati devono essere smaltiti nel contenitore per rifiuti sanitari a rischio infettivo (clinical box) facendo seguire il lavaggio mani con soluzione antisettica o l'igiene mani con soluzione di gel alcoolico.

8.4 Trattamento del mezzo di trasporto e delle attrezzature

Prima di iniziare la pulizia lasciare i finestrini e/o le portiere aperti per almeno 15' per permettere l'aerazione e, quindi, la diluizione delle particelle sospese degli abitacoli. Il personale adibito alla pulizia interna del mezzo deve indossare i DPI (allegati 1,2,3,6).

Per le pulizie, se possibile, utilizzare materiale monouso. Detergere tutte le parti esposte dell'ambulanza e poi disinfettarle (sodiodicloroisocianurato 3 compresse in 5 litri di acqua) Ripristinare i presidi sanitari riutilizzabili come di consueto.

A fine operazioni eliminare il materiale monouso usato per le pulizie e i DPI monouso nel clinical box e lavarsi le mani con antisettico.

L'ambulanza può essere riutilizzata solo dopo l'espletamento delle suddette manovre.

GESTIONE SINDROME INFLUENZALE: PERCORSO E MISURE DI PROTEZIONE P.O. NOVI LIGURE	SETTEMBRE 2009 Codice: AL.RCRI.009.2009.00
--	--	--

9. GESTIONE DI UN CASO CHE ACCEDE DIRETTAMENTE AD UN AMBULATORIO E/O SERVIZIO

Nel caso di paziente con ILI che accede direttamente ad ambulatorio o servizio (radiologia, centro prelievi ecc) adottare le seguenti precauzioni:

Paziente:

- ✓ uso di mascherina chirurgica che copra bocca e naso
- ✓ igiene respiratoria, coprendo bocca e naso con la mano o con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce (i fazzoletti in tessuto devono essere usati una sola volta)
- ✓ igiene delle mani con acqua e detergente o con gel idroalcolico in particolare dopo essersi soffiati il naso o aver tossito o starnutito
- ✓ smaltimento immediato dei fazzoletti monouso utilizzati negli appositi contenitori (clinical box)

Operatori:

- ✓ durante le procedure standard indossare i seguenti DPI: mascherina chirurgica, guanti, camici tnt
- ✓ in caso di procedure che possono generare aerosol indossare i seguenti DPI: facciale filtrante P2, guanti, camici tnt e occhiali
- ✓ smaltire i DPI usati come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
- ✓ igiene delle mani con acqua e detergente o con gel idroalcolico prima e dopo contatto con il paziente, dopo contatto con materiale biologico e dopo la rimozione dei guanti

Si raccomanda inoltre di fornire al paziente foglio informativo (allegato 5) con l'invito di rivolgersi al proprio medico curante.

Se il clinico valuta la necessità di ricovero invia il paziente presso il DEA previo contatto telefonico con il personale di triage.

GESTIONE SINDROME INFLUENZALE: PERCORSO E MISURE DI PROTEZIONE P.O. NOVI LIGURE	SETTEMBRE 2009 Codice: AL.RCRI.009.2009.00
--	--	--

10. RICOVERO IN REPARTO

Sulla base delle valutazioni cliniche globali del medico del DEA, ragionate e condivise con il medico dell'Unità Operativa potenzialmente accettante e secondo la stabilità clinica, si decide per il ricovero in Medicina, Pediatria o in Rianimazione.

In caso di indisponibilità del posto letto presso tali SS.OO. il clinico proponente il ricovero provvederà a reperire adeguata sede per rendere possibile il ricovero in altre sedi ospedaliere prioritariamente dell'ASL.

Viene individuata come camera di isolamento la camera singola dotata di servizi igienici singola (letto 1 e 36 delle camere del monoblocco).

In Pediatria è individuata la camera n. _____

Nell'evenienza di più casi effettuare l'isolamento di coorte (raggruppare i pazienti con sindrome influenzale nella stessa camera).

Si ricorda che il periodo di contagiosità inizia un po' prima che si manifestino i primi sintomi della malattia e si prolunga per 5 - 7 giorni dall'inizio dei sintomi (il periodo di contagiosità nei bambini può essere più lungo).

Trascorso questo tempo l'isolamento può essere sospeso.

Per quanto riguarda l'assistenza al paziente e le misure di protezione fare riferimento ai punti 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 - 7.5 e agli allegati 1, 2, 3, 6 e ai documenti correlati.

Nel caso di ricovero in Pediatria si raccomanda agli operatori di fornire, a chi permane in camera con il bambino, tutte le informazioni necessarie per limitare la diffusione del virus e sulle misure di protezione da adottare (DPI, igiene mani e norme comportamentali).

<p>ASL REGIONE PIEMONTE</p>	<p>GESTIONE SINDROME INFLUENZALE: PERCORSO E MISURE DI PROTEZIONE P.O. NOVI LIGURE</p>	<p>SETTEMBRE 2009</p> <p>Codice: AL.RCRI.009.2009.00</p>
--	---	--

11. VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA

Sono di seguito definiti criteri, indicatori e standard allo scopo di verificare l'adesione degli operatori alla procedura.

- CRITERIO:

I pazienti notificati con ILI ricoverati rispondono ai criteri di ospedalizzazione previsti

- INDICATORE :

Numero pazienti con ricovero appropriato sul totale dei ricoveri ILI notificati

- STANDARD : 90%

GESTIONE SINDROME INFLUENZALE: PERCORSO E MISURE DI PROTEZIONE P.O. NOVI LIGURE	SETTEMBRE 2009 Codice: AL.RCRI.009.2009.00
--	--	--

DOCUMENTI CORRELATI

- Manuale “isolamento ospedaliero dei pazienti con malattie infettive”
- Procedura di segnalazione di malattia infettiva trasmissibile finalizzata alla sorveglianza e profilassi dei contatti
- Procedura: “ Interventi da attuare in caso di contatto del personale dell’impresa di pulizia con paziente affetto da malattia infettiva trasmissibile”
- Procedura sul corretto utilizzo dei “ DPI”
- Prontuario antisettici e disinfettanti
- Manuale di Microbiologia
- Circolari interne di aggiornamento Influenza Virus A/H1N1v

BIBLIOGRAFIA

- La gestione della sindrome influenzale Documento 16 Maggio 2008 Pnlg ISS – Ministero Salute
- Prevenzione e controllo dell’influenza: Raccomandazioni per la stagione 2009 – 2010 Roma 23 luglio 2009 Ministero del lavoro, della salute, delle politiche sociali
- “ Aggiornamento delle indicazioni relative alla prevenzione, sorveglianza e controllo della NUOVA INFLUENZA DA VIRUS INFLUENZALE A/H1N1v, Ministero del lavoro, della salute, delle politiche sociali Roma 24 luglio 2009
- Manuale per il Controllo delle Malattie Trasmissibili Rapporto ufficiale dell’American Public Health Association 18° Edizione
- Sindrome influenzale del nuovo virus del tipo A/H1N1 – Ministero del lavoro, della salute, delle politiche sociali Roma 2 Maggio 2009

ALLEGATO 1

PRECAUZIONI STANDARD¹

Le precauzioni Standard contemplano²:

INDICAZIONI PER L'IGIENE DELLE MANI

Lavare le mani con acqua e sapone o con acqua e antisettico quando sono visibilmente sporche o contaminate con materiale organico, sangue o liquidi biologici
Se le mani non sono visibilmente sporche, utilizzare un antisettico a base alcolica per la decontaminazione routinaria delle mani.

Effettuare l'igiene delle mani:

- prima di qualsiasi contatto diretto con il paziente
- dopo il contatto con la cute sanguine, fluidi biologici o escrezioni, mucose, cute non integra, o medicazioni deferite
- dopo il contatto con la cute integra del paziente (ad es. prendere il polso o la pressione arteriosa, o sollevare il paziente)
- Se le mani devono passare da una parte contaminata del corpo ad una pulita
- Dopo il contatto con oggetti (comprese attrezzature mediche) nelle immediate vicinanze del paziente
- Dopo aver rimosso i guanti

uso di guanti puliti, non sterili, quale barriera per liquidi biologici o oggetti infetti; cambiare i guanti dopo ogni procedura, tra un paziente e il successivo;

uso di maschere, protezione per gli occhi, schermi facciali nell'effettuazione di quelle procedure a rischio di produrre spruzzi o la diffusione di liquidi biologici;

uso aggiuntivo di camici nell'effettuazione di quelle procedure a rischio di produrre spruzzi o schizzi biologici;

le attrezzature per l'assistenza del paziente, una volta usate devono essere maneggiate con cura onde prevenire la trasmissione di microrganismi;

per il **controllo ambientale** occorre assicurarsi che siano in atto procedure adeguate per l'assistenza routinario, la pulizia e la disinfezione;

per la **biancheria** contaminata occorre che essa venga trattata in modo da evitare la trasmissione dei microrganismi;

per la **tutela della salute dei lavoratori** occorre un uso e uno smaltimento appropriato di aghi e taglienti; usare boccagli e palloni per la ventilazione come alternativa ai metodi di rianimazione bocca a bocca;

¹ "Center for Disease Control, Sistemi di isolamento 2007"

² Vedi anche Il Manuale delle misure di isolamento del paziente in ospedale" aziendale.

GESTIONE SINDROME INFLUENZALE: PERCORSO E MISURE DI PROTEZIONE P.O. NOVI LIGURE	SETTEMBRE 2009 Codice: AL.RCRI.009.2009.00
--	--	--

ALLEGATO 2

PRECAUZIONI AGGIUNTIVE¹	
	precauzioni malattie trasmesse attraverso droplet (goccioline)
Sistemazione del paziente	Camera singola dotata di servizi igienici; Isolamento in coorte
Protezioni respiratorie	SI (mascherina chirurgica, facciale filtrante FFP2, FFP3 (a seconda delle manovre effettuate generanti aerosol))
Protezione mucosa congiuntivale	occhiali a mascherina tipo sub, visor , mascherina con visiera
Trasporto paziente	Mascherine chirurgiche
Attrezzatura per assistenza	Vedi prontuario disinfettanti

ALLEGATO 3

PROCEDURA DI VESTIZIONE/SVESTIZIONE DEGLI OPERATORI: MODALITA' DI UTILIZZO E RIMOZIONE DEI DPI
<p>Il rispetto della sequenza consente una più rapida e funzionale vestizione ma, soprattutto una svestizione con limitati rischi di contaminazione per l'operatore.</p> <p>Vestizione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indossare camice in tnt - Indossare una protezione respiratoria e congiuntivale (mascherina con visiera o visor e/o facciale filtrante + con visiera o occhiali) - Indossare i guanti <p>Svestizione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rimuovere i guanti. - Eseguire lavaggio con antisettico delle mani o decontaminazione con gel alcoolico - Rimuovere visiera protettiva/occhiali evitando di toccare la superficie esterna - Rimuovere mascherina/filtrante facciale evitando di toccare la superficie esterna - Eseguire lavaggio con antisettico delle mani o decontaminazione con gel alcoolico

¹ "Center for Disease Control, Sistemi di isolamento 2007"

SCHEDA NOTIFICA

ALLEGATO 4

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI MALATTIA INFETTIVA

Cognome _____ Nome _____

Sesso M F Data di nascita ___ / ___ / _____

Età compiuta: inferiore a 1 anno (0 – 11 mesi) |__|__|

superiore a 1 anno (1 – 99 anni) |__|__|

Professione _____ Cittadinanza _____

Domicilio abituale:

Indirizzo _____ Comune _____

Residenza (se non coincide con domicilio abituale:

Indirizzo _____ Comune _____

Composizione nucleo familiare ed età componenti (se comunità indicarne solo il tipo)

Diagnosi _____

Tipo di diagnosi: sospetta accertata

Tipo accertamenti effettuati: _____

Ricovero in ospedale si no

Data insorgenza primi sintomi: |__|__| |__|__| |__|__|

Luogo insorgenza primi sintomi: _____

Luogo e modalità presunto contagio: _____

Isolamento o altre misure adottate: _____

vaccinato non vaccinato non noto

Data ___ / ___ / ___

Firma, timbro, recapito e n.° telef. medico segnalante

FOGLIO INFORMATIVO

ALLEGATO 5

Cosa fare per proteggere se stessi e gli altri
È possibile diminuire il rischio di infezione adottando una serie di semplici comportamenti.

- **LAVARE LE MANI**
Accuratamente e più volte al giorno, sempre con acqua e sapone. In particolare, dopo aver tossito, starnutito, essersi soffiati il naso.
- **TOSSIRE O STARNUTIRE IN UN FAZZOLETTO DI CARTA**
Quando si tosse o starnutisce, tenere un fazzoletto di carta davanti al naso e bocca.
- **GETTARE IL FAZZOLETTO DI CARTA**
Dopo l'uso gettare sempre il fazzoletto di carta nel cestino dei rifiuti e lavarsi le mani accuratamente con acqua e sapone.

Infine Le raccomandiamo di
**“INDOSSARE LA MASCHERINA, SE LE VIENE RICHIESTO,
COPRENDO BENE NASO E BOCCA”.**

ALLEGATO 6

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI E DELL'AMBIENTE

Manipolare le attrezzature con gli adeguati DPI.

Lavare le mani, dopo aver rimosso i guanti, dopo ogni manovra in cui vi sia stato contatto con materiale biologico e/o con attrezzature utilizzate sul paziente.

Ricorrere alle operazioni di pulizia e di disinfezione, per le attrezzature utilizzate per l'assistenza sul paziente (monitor, ossimetri, ecc.).

Prediligere, in accordo con le indicazioni del produttore, sistemi di disinfezione piuttosto che di sola pulizia.

Verificare, per ventilatori e impianti di condizionamento, la presenza di filtri HEPA.

Avviare al consueto ciclo di lavaggio la biancheria (lenzuola, asciugamani, ecc.).

Trattare, stoviglie e posate secondo il consueto ciclo di trattamento; se possibile prediligere materiale monouso.

Per tutte le operazioni di pulizia indossare i DPI.

Ventilare sistematicamente i locali (ventilazione naturale, in assenza di impianto di condizionamento con filtrazione separata).

Limitare l'ingombro dei locali al fine di favorire le operazioni di pulizia.

Trattare frequentemente (ed almeno 1 volta al giorno) le superfici con acqua e detergente/disinfettante (insistere in particolare su interruttori, rubinetti, maniglie e manopole, lavabi, wC).

Disinfettare pareti o altre superfici verticali se non visibilmente contaminate con materiale biologico.

Decontaminare spargimenti di materiale biologico con applicazione di granuli di sodiodicloroisocianurato (BIONIL granuli), successivamente detergere/disinfettare con il disinfettante previsto dai protocolli di disinfezione in uso.

Non nebulizzare prodotti disinfettanti (operazione inefficace).

ALLEGATO 7

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**

0

Bagna le mani con l'acqua

1

applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

2

friziona le mani palmo contro palmo

3

il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

4

palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

5

dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

6

frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

7

frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa

8

Risciacqua le mani con l'acqua

9

asciuga accuratamente con una salvietta monouso

10

usa la salvietta per chiudere il rubinetto

11

...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE
for **PATIENT SAFETY**

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.
October 2006, version 1.

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

Come **frizionare** le mani con la soluzione alcolica?

**USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!**

Durata dell'intera procedura: **20-30 secondi**

Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

frizionare le mani palmo contro palmo

il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa

...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

ALLEGATO 9

SEQUENZA DI UTILIZZO DEI DPI

PRIMA DI ENTRARE NEL LOCALE O DI VISITARE IL PAZIENTE

Fase 1: indossare il camice monouso.

Fase 2a: indossare la mascherina chirurgica sopra il naso, la bocca e il mento, assicurarla con gli elastici/lacci sopra la testa.

Fase 2b: se sussiste la necessità allora **INDOSSARE** il FFP-2 sopra il naso, la bocca e il mento, stringere la parte flessibile sopra il naso, assicurarla con gli elastici/lacci sopra la testa.

Fase 3: eseguire la prova di tenuta FFP-2: inspirando la maschera deve collassare, espirando si controllano eventuali perdite dai bordi.

Fase 4: indossare, se necessario gli occhiai protettivi ed assicurarsi che siano aderenti al viso.

Fase 5: indossare i guanti monouso.

ALLEGATO 10

DOPO LA VISITA DEL PAZIENTE / PRELIEVO DEL CAMPIONE

Fase 1: sfilare i guanti rivoltandoli e riporli nell'apposito sacchetto richiudibile o contenitore per materiali a rischio biologico.

Fase 2: togliere il camice monouso e riporlo nell'apposito sacchetto richiudibile o contenitore per materiali a rischio biologico

Fase 3: igiene delle mani:

- o con acqua e sapone
- o con salviette disinfettanti
- o con gel disinfettante a base alcolica

Fase 4: togliere gli occhiali protettivi. NON GETTARE ma riporli nel sacchetto dedicato epr la successiva decontaminazione

Fase 5:

togliere la maschera e riporla nell'apposito sacchetto richiudibile o contenitore per materiali a rischio biologico.

Fase 6: igiene delle mani:

- o con acqua e sapone
- o con salviette disinfettanti
- o con gel disinfettante a base alcolica