



**MODULO DI PRESCRIZIONE CHEMIOPROFILASSI
IN CASO DI MENINGITE o MALATTIA INVASIVA BATTERICA**

Si prescrive chemiopprofilassi con

al Sig./Sig.ra

dipendente presso

Il medico
(timbro e firma)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO

Io sottoscritto

dichiaro:

- di aver ricevuto un'informazione comprensibile ed esauriente sull'atto proposto attraverso il colloquio con il medico ed il modulo informativo allegato
- di non essere allergico agli antibiotici
- di essere allergico alle seguenti molecole antibiotiche

Per donne in età fertile:

- di non essere in stato di gravidanza
- di essere in stato di gravidanza

- di ACCETTARE NON ACCETTARE liberamente, spontaneamente e in piena coscienza l'atto sanitario proposto.

Data _____

Firma _____

**INFORMAZIONI SU EFFICACIA, RISCHI ED EFFETTI COLLATERALI
DELLA CHEMIOPROFILASSI
IN CASO DI SOSPETTA od ACCERTATA MENINGITE
o MALATTIA INVASIVA BATTERICA**

Farmaci per la chemiopprofilassi

Farmaco	Età	Dose	Durata trattam.	Efficacia	Precauzioni Avvertenze
Rifampicina	<1 mese	5 mg/kg ogni 12 ore per os	2 giorni (4 dosi)	90-95%	Può interferire con numerosi farmaci, pertanto fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto. Possibile emissione di urine rosse; possibili macchie sulle lenti a contatto morbide. Non raccomandato in gravidanza e allattamento.
	≥1 mese	10 mg/kg (max 600 mg) ogni 12 ore per os	2 giorni (4 dosi)		
	Adulti	600 mg ogni 12 ore per os	2 giorni (4 dosi)		
Ceftriaxone	<15 anni	125 mg i.m.	Dose singola	90-95%	Può essere usato in gravidanza
	≥15 anni	250 mg i.m.			
Ciprofloxacina	≥18 anni	500 mg per os	Dose singola	90-95%	Non usare in gravidanza. Segnalate reazioni anafilattiche e convulsioni.

La ciprofloxacina possiede vantaggi rispetto agli altri farmaci:

- è somministrata in dose singola
- non interagisce con i contraccettivi orali

Dopo la sua somministrazione sono tuttavia segnalate:

- reazioni anafilattiche
- convulsioni nei pazienti con o senza anamnesi positiva per questo disturbo

La ciprofloxacina non deve essere usata in gravidanza. Nelle donne in gravidanza si può usare il ceftriaxone.

Le modalità attraverso cui una chemiopprofilassi può determinare un danno sono essenzialmente tre:

1. il soggetto può presentare reazioni avverse al farmaco
2. la chemiopprofilassi può eradicare *Neisseria lactamica*, batterio non patogeno capace di indurre immunità cross-protettiva (in altre parole l'innocuo *N. lactamica* può indurre nell'ospite un'immunità efficace anche nei confronti di *N. meningitidis*).
3. possono emergere ceppi batterici antibioticoresistenti