

FARMACI SALVAVITA DI USO RARO - QUANTITATIVI MINIMI CHE DEVONO ESSERE SEMPRE PRESENTI SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL COORDINATORE INFERMIERISTICO

ATTENZIONE! SI RICORDA CHE I FARMACI EMODERIVATI E NON, DISPONIBILI A MAGAZZINO PRESSO LA SEDE DI DISTRIBUZIONE INTERNA (GUM O FARMACIA), DEVONO ESSERE RICHIESTI SEMPRE PRESSO TALE SEDE IN ORARIO DI APERTURA DELLA STESSA, TRANNE CHE IN CASO DI NON DISPONIBILITA' O DI URGENZA EFFETTIVA, ONDE EVITARE CHE IL CENTRO DI STOCCAGGIO DI EMERGENZA POSSA RISCHIARE DI RIMANERNE SPROVVISTO.

SI RACCOMANDA AI REPARTI O SERVIZI INTERESSATI DI STAMPARE UNA COPIA AGGIORNATA E TENERLA BENE IN VISTA A DISPOSIZIONE IN CASO DI EMERGENZA, INSIEME A QUELLA DEGLI ANTIDOTI

AGGRASTAT 250 MCG/ML-50 ML 2 FLACONI in CARDIOLOGIA // ACTILYSE 50 MG 4 FLACONI in NEUROLOGIA // SIMDAX 2,5 MG/ML - 5 ML UN FLACONE in RIANIMAZIONE // UROCHINASI 20 FLACONI in DIALISI // ATTENZIONE ! DEA E ! PPI DEVONO AVERE PER L'IMA: TICAGRELOR 90 MG (BRILIQUE) - CLOPIDOGREL 75 MG - PRASUGREL 10 MG (EFIENT)

ATC	Descriz ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocco Operatorio	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocchi Operatori (BLOCCO del Primo Piano e BLOCCO del Secondo Piano)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Ciascun Blocco Operatorio (2 BLOCCHI di cui uno per Ostetricia Ginecologia)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia
			NOVI LIGURE			OVADA	ACQUI TERME				TORTONA			CASALE M.				
B01	ANTITROMBOTICI																	
B01AB02	ANTITROMBINA III	AT III KEDRION 1000 UI	AT III KEDRION: Conservare in frigorifero (da +2°C a +8°C).Non congelare.Tenere il flaconcino nell'imballaggio esterno, per proteggere il medicinale dalla luce.	9000 U			5000 U				5000 U				5000 U			9
B02	ANTIEMORRAGICI																	
B02BD01	COMPLESSO PROTROMBINICO	KEDCOM (UMAN COMPLEX DI) 500 UI EV	KEDCOM (UMAN COMPLEX) Conservare in frigorifero (da +2 °C a +8 °C).Tenere il flaconcino nell'imballaggio esterno, per proteggere il medicinale dalla luce.Non congelare.	3500 U			3500 U				3500 U				3500 U			
B02BD02	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO	KLOTT (EMOCLOT) 1000 U	KLOTT (EMOCLOT) Conservare in frigorifero (da +2 °C a + 8 °C). Non congelare.Tenere il flaconcino nell'imballaggio esterno, per proteggere il medicinale dalla luce	6000 U			6000 U				6000 U				6000 U			

ATC	Descriz ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE	NOVI LIGURE			OVADA	ACQUI TERME			TORTONA			CASALE M.				
			Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocco Operatorio	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocci Operatori (BLOCCO del Primo Piano e BLOCCO del Secondo Piano)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Ciascun Blocco Operatorio (2 BLOCCHI di cui uno per Ostetricia Ginecologia)	Scorta presso DEA
B02BD02	FATTORE VIII e Von Willebrand	FANHDI 1000 U contiene quantità elevate (non meno di 500 U.I./1000 U.I. FVIII), stand.di multimeri di fattore Von Willebrand (VWF) oppure HAEMATE P 1000 UI	FANHDI 1000 U: Conservare a temperatura non superiore a 30 °C. Non congelare. Tenere al riparo dalla luce. Non usare dopo la data di scadenza. // HAEMATE P Haemate P 500/1000 non deve essere conservato ad una temperatura superiore a +25°C. Non congelare. Conservare il contenuto nella confezione.	4000 U			4000 U				4000 U				4000 U		
B02BD04	FATTORE IX COAGULAZIONE SANGUE	IXED (AIMAFIX) 1000 UI	IXED (AIMAFIX) Conservare in frigorifero (da +2°C a +8°C). Non congelare. Tenere il flaconcino nell'imballaggio esterno, per proteggere il medicinale dalla luce.	4000 U			4000 U				4000 U				4000 U		
B02BD08	EPTACOG ALFA ATTIVATO (FATTORE VIIA RICOMBINANTE o rFVIIa)	NOVOSEVEN 2 MG	NOVOSEVEN Conservare polvere e solvente al di sotto di 25°C. Conservare polvere e solvente al riparo dalla luce. Non congelare per prevenire danni al flaconcino di solvente/siringa preriempita.	6			6				6				6		
B05	ALBUMINA																
B05AA01	ALBUMINA UMANA	ALBITAL 20% 50 ML	ALBUMINA UMANA La temperatura di conservazione può variare a seconda della specialità	20		10	20				20				20		
			SEGUE														

ATC	Descriz ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocco Operatorio	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocchi Operatori (BLOCCO del Primo Piano e BLOCCO del Secondo Piano)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Ciascun Blocco Operatorio (2 BLOCCHI di cui uno per Ostetricia Ginecologia)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia
			NOVI LIGURE			OVADA	ACQUI TERME				TORTONA				CASALE M.			
H01	VASOPRESSINA, ANALOGHI																	
H01BA04	TERLIPRESSINA (ACETATO IDRATO)	GLIPRESSINA (terlipressina acetato 1 mg) EV.F.	GLIPRESSINA Conservare a temperatura non superiore a 25°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce		5 f				5 f.				5 f.			5 fiale		
H03AA	ORMONI TIROIDEI																	
H03AA01	LEVOTIROXINA	L-THYROXIN fl 0,2 MG (farmaco di importazione dall'estero)	L-TYROXINE Vedere sulla confezione o nel foglietto illustrativo								12 F (2 scatole da 6 fiale)							
J01	ANTIBATTERICI																	
ANTIBATTERICI PER PROFILASSI ANTI-MENINGITE DA MENINGOCOCCO																		
J01MA02	CIPROFLOXACINA	CIPROXIN MG.500 CP	CIPROXIN La specialità non ha una temperatura particolare di conservazione		2 confezioni	2 confezioni			2 confezioni				2 confezioni				2 confezioni	
J04AB02	RIFAMPICINA	RIFADIN MG.300 CP	RIFADIN La specialità non ha una temperatura particolare di conservazione		10 confezioni	10 confezioni			10 confezioni				10 confezioni				10 confezioni	
J04AB02	RIFAMPICINA	RIFADIN 20 mg/ml sciroppo fialone 60 ml	RIFADIN Conservazione: Non conservare a temperatura superiore ai 25°C		3 fl	2 fl			3 fl				3 fl				3 fl	
J01X	ALTRI ANTIBATTERICI																	
J01XX09	DAPTOMICINA	CUBICIN MG.350 - MG.500	conservare in frigorifero tra +2°C e +8°C								2 flac mg.500				10 F. MG.500 - 10 F.MG.350			
J02	ANTIMICOTICI PER USO SISTEMICO																	
J02AA01	AMFOTERICINA B Liposomiale	AMBISOME 50 MG F EV	AMBISOME Conservare a temperatura non superiore ai 25°C i flaconcini sigillati di polvere liofilizzata												10 fl			

ATC	Descriz. ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocco Operatorio	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocchi Operatori (BLOCCO del Primo Piano e BLOCCO del Secondo Piano)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Ciascun Blocco Operatorio (2 BLOCCHI di cui uno per Ostetricia Ginecologia)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia
			NOVI LIGURE		OVADA	ACQUI TERME				TORTONA				CASALE M.				
	ROCURONIO E IL SUO ANTIDOTO																	
M03AC09	ROCURONIO:																	
M03AC09	BROMURO DI ROCURONIO	ROCURONIO 50 mg /5 ml in confezione da 10 Fiale (una confezione = 500 mg)	ROCURONIO KABI Conservare in frigorifero (2°C - 8°C).	20 fiale da mg.50	20 fiale da mg.50			20 fiale da mg.50				40 fiale da mg.50 - 20 fiale per piano			20 f da mg.50	40 f da mg.50 - 20 fiale per blocco		
V03AB	ANTIDOTO DEL ROCURONIO:																	
V03AB35	SUGAMMADEX	BRIDION mg.200 / 2 ml - 10 fiale (una confezione = 2000 mg)	BRIDION Conservare a temperatura inferiore a 30°C. Non congelare. Al riparo dalla luce	10 f. da mg.200 (una confezione)	10 f. da mg.200 (una confezione)			10 f. da mg.200 (una confezione)				20 f. da mg.200 (DUE CONFEZIONI) di cui 10 f (una confezione) per piano			10 f. da mg.200 (una confezione)	20 f. da mg.200 (DUE confezioni) di cui 10 f (una confezione) per blocco		
FARMACI D'EMERGENZA IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA																		

I reparti di Ostetricia e Ginecologia devono obbligatoriamente avere i seguenti farmaci in quantità congrua. Nei Presidi Ospedalieri ove non è presente il Reparto di Ostetricia e Ginecologia gli stessi farmaci devono essere presenti presso i DEA/PPS e gli stessi, se inutilizzati, a 6 mesi dalla scadenza, dovrebbero essere inviati ai reparti di Ostetricia-Ginecologia e scambiati con confezioni di recente acquisto e con validità lunga, evitando così di ricomprarli alla scadenza.

H01BB02	Oxitocina	SYNTOCINON 5UI/ML SOL.IN.6F (4 CONFEZIONI)	SYNTOCINON Conservare in frigorifero (2-8°C). Conservare nella confezione originale per proteggere il prodotto dalla luce.					24 F							24 F			
G02AB01	Metilergometrina	METHERGIN IM IV 6F 1ML 0,2MG/M (UNA CONFEZIONE)	METHERGIN Conservare tra 2°C e 8°C. Non congelare. Tenere le fiale nell'imballaggio esterno per proteggerle dalla luce. Le fiale possono essere conservate per 2 settimane fuori dal frigorifero, ma a temperature non superiori a 25°C.					6 F							6 F			
G02AD05	Sulprostone	NALADOR INIET 1F 0,5MG 2ML (12 FIALE)	NALADOR Conservare in frigorifero (2- 8°C). Il prodotto può essere conservato a temperature superiori, purché non oltre i 25°C, per un periodo massimo di 8 giorni.					12 F							12 F			

ATC	Descriz ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocco Operatorio	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocchi Operatori (BLOCCO del Primo Piano e BLOCCO del Secondo Piano)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Ciascun Blocco Operatorio (2 BLOCCHI di cui uno per Ostetricia Ginecologia)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	
																			NOVI LIGURE
G02CA01	Ritodrina	MIOLINE 50 mg/5 ml soluzione per infusione(UNA CONFEZIONE)	MIOLINE Nessuna speciale precauzione per la conservazione			UNA CONFEZIONE			UNA CONFEZIONE					UNA CONFEZIONE					
G02CA49	isoxsuprina cloridrato	VASOSUPRINA ILFI 10 mg/2 ml SOLUZIONE INIETTABILE (2 CONFEZIONI)	VASOSUPRINA Conservare in normali condizioni ambientali			DUE CONFEZIONI			DUE CONFEZIONI					DUE CONFEZIONI					
G02CX01	Atosiban	TRACTOCILE 37,5 mg di atosiban (sotto forma di acetato)	Conservare in frigorifero (2°C - 8°C).Conservare nella confezione originale per proteggerlo dalla luce.			UNA CONFEZIONE			DUE CONFEZIONI					UNA CONFEZIONE					
G02CX01	Atosiban	TRACTOCILE 6,75 mg di atosiban (sotto forma di acetato)				UNA CONFEZIONE				DUE CONFEZIONI					UNA CONFEZIONE				