

**FARMACI SALVAVITA DI USO RARO - QUANTITATIVI MINIMI CHE DEVONO ESSERE SEMPRE PRESENTI SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL COORDINATORE
INFERMIERISTICO**

ATTENZIONE! SI RICORDA CHE I FARMACI EMODERIVATI E NON, DISPONIBILI A MAGAZZINO PRESSO LA SEDE DI DISTRIBUZIONE INTERNA (GUM O FARMACIA), DEVONO ESSERE RICHIESTI SEMPRE PRESSO TALE SEDE IN ORARIO DI APERTURA DELLA STESSA, TRANNE CHE IN CASO DI NON DISPONIBILITA' O DI URGENZA EFFETTIVA, ONDE EVITARE CHE IL CENTRO DI STOCCAGGIO DI EMERGENZA POSSA RISCHIARE DI RIMANERNE SPROVVISTO.

AGGRASTAT 250 MCG/ML-50 ML 2 FLACONI in CARDIOLOGIA // ACTILYSE 50 MG 4 FLACONI in NEUROLOGIA // SIMDAX 2,5 MG/ML - 5 ML UN FLACONE in RIANIMAZIONE // UROCHINASI 20 FLACONI in DIALISI // ATTENZIONE! DEA E I PPI DEVONO AVERE PER L'IMA: TICAGRELOR 90 MG (BRILIQUE) - CLOPIDOGREL 75 MG - PRASUGREL 10 MG (EFIENT)

ATC	Descriz ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE		Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia
				NOVI LIGURE		OVADA	ACQUI TERME			TORTONA			CASALE M.		
B01	ANTITROMBOTICI														
B01AB02	ANTITROMBINA III	AT III KEDRION 1000 UI	AT III KEDRION: Conservare in frigorifero (da +2°C a +8°C). Non congelare. Tenere il flaconcino nell'imballaggio esterno, per proteggere il medicinale dalla luce.	9000 U			5000 U			5000 U			5000 U		9
B02	ANTIEMORRAGICI														
B02BD01	COMPLESSO PROTROMBINICO	KEDCOM (UMAN COMPLEX DI) 500 UI EV	KEDCOM (UMAN COMPLEX) Conservare in frigorifero (da +2 °C a +8 °C). Tenere il flaconcino nell'imballaggio esterno, per proteggere il medicinale dalla luce. Non congelare.	3500 U			3500 U			3500 U			3500 U		
B02BD02	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO	KLOTT (EMOCLOT) 1000 U	KLOTT (EMOCLOT) Conservare in frigorifero (da +2 °C a + 8 °C). Non congelare. Tenere il flaconcino nell'imballaggio esterno, per proteggere il medicinale dalla luce	6000 U			6000 U			6000 U			6000 U		
B02BD02	FATTORE VIII e Von Willebrand	FANHDI 1000 U contiene quantità elevate (non meno di 500 U.I./1000 U.I. F.VIII), stand. di multimeri di fattore Von Willebrand (VWF) oppure HAEMATE P 1000 UI	FANHDI 1000 U: Conservare a temperatura non superiore a 30 °C. Non congelare. Tenere al riparo dalla luce. Non usare dopo la data di scadenza. // HAEMATE P Haemate P 500/1000 non deve essere conservato ad una temperatura superiore a +25°C. Non congelare. Conservare il contenuto nella confezione.	4000 U			4000 U			4000 U			4000 U		

ATC	Descriz ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE		Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia
				NOVI LIGURE		OVADA	ACQUI TERME			TORTONA			CASALE M.		
B02BD04	FATTORE IX COAGULAZIONE SANGUE	IXED (AIMAFIX) 1000 UI	IXED (AIMAFIX) Conservare in frigorifero (da +2°C a +8°C). Non congelare. Tenere il flaconcino nell'imballaggio esterno, per proteggere il medicinale dalla luce.	4000 U			4000 U			4000 U			4000 U		
B02BD08	EPTACOG ALFA ATTIVATO (FATTORE VIIA RICOMBINANTE o rFVIIa)	NOVOSEVEN 2 MG	NOVOSEVEN Conservare polvere e solvente al di sotto di 25°C. Conservare polvere e solvente al riparo dalla luce. Non congelare per prevenire danni al flaconcino di solvente/siringa preriempita.	6			6			6			6		
B05	ALBUMINA														
B05AA01	ALBUMINA UMANA	ALBITAL 20% 50 ML	ALBUMINA UMANA La temperatura di conservazione può variare a seconda della specialità	20		10	20			20			20		
B06	ALTRI AGENTI EMATOLOGICI														
B06AC02	icatibant acetato: PRORITA' 1 (entro 30 minuti)	FIRAZYR 30 mg soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita 3 ml: <u>a NOVE MESI DALLA SCADENZA</u> le fiale vanno inviate alle farmacie di Novi Ligure e Tortona, che le sostituiranno con fiale con periodo di validità più lungo, se disponibili. FIRAZYR Non conservare a temperature superiori ai 25°C. Non congelare.			1 - presso il DEA	1 - presso il PS		1 - presso il DEA			1 - presso il DEA			1 - presso il DEA	
C01C	STIMOLANTI CARDIACI														
C01CA04	DOPAMINA	DOPAMINA HOSPIRA (ex REVIVAN) 200 MG - 5 ML F - ATTENZIONE: I NOMI DEI FARMACI GENERICI DOPAMINA E DOBUTAMINA SONO FACILMENTE CONFONDIBILI: OCCORRE METTERE IN ATTO STRATEGIE PER EVITARE IL CONFONDIMENTO TRA DOPAMINA E DOBUTAMINA // DOPAMINA HOSPIRA Conservare a temperatura non superiore ai 25°C e nella confezione originale			SI	SI		SI	10 f		SI	10 f		SI	10 f
C01CA07	DOBUTAMINA	MIOZAC (DOBUTREX) 250 MG./ML.20 EV. F. - ATTENZIONE: I NOMI DEI FARMACI GENERICI DOPAMINA E DOBUTAMINA SONO FACILMENTE CONFONDIBILI: OCCORRE METTERE IN ATTO STRATEGIE PER EVITARE IL CONFONDIMENTO TRA DOPAMINA E DOBUTAMINA - MIOZAC Conservare ad una temperatura inferiore a 25°C e al riparo dalla luce.			SI	SI		SI	10 f		SI	10 f		SI	10 f

ATC	Descriz ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE		Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia
				NOVI LIGURE		OVADA		ACQUI TERME			TORTONA			CASALE M.	
C01CA19	FENOLDOPAM (MESILATO)	CORLOPAM mg.20	CORLOPAM Conservare ad una temperatura non superiore a 25°C al riparo dalla luce.	3 fiale										10	
H01	VASOPRESSINA, ANALOGHI														
H01BA04	TERLIPRESSINA (ACETATO IDRATO)	GLIPRESSINA (terlipressina acetato 1 mg) EV.F.	GLIPRESSINA Conservare a temperatura non superiore a 25°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce		5 f			5 f.			5 f.			5 fiale	
H03AA	ORMONI TIROIDEI														
H03AA01	Levotiroxina sodica	L-THYROXIN fl 0,5 MG EV (farmaco di importazione dall'estero)	L-THYROXIN Vedere sulla confezione o nel foglietto illustrativo							5 F					
J01	ANTIBATTERICI														
	ANTIBATTERICI PER PROFILASSI ANTI-MENINGITE DA MENINGOCOCCO														
J01MA02	CIPROFLOXACINA	CIPROXIN MG.500 CP	CIPROXIN La specialità non ha una temperatura particolare di conservazione		2 con-fezioni	2 confezioni		2 confezioni			2 confezioni			2 confezioni	
J04AB02	RIFAMPICINA	RIFADIN MG.300 CP	RIFADIN La specialità non ha una temperatura particolare di conservazione		10 confezioni	10 confezioni		10 confezioni			10 confezioni			10 confezioni	
J04AB02	RIFAMPICINA	RIFADIN 20 mg/ml sciroppo flacone 60 ml	RIFADIN Conservazione: Non conservare a temperatura superiore ai 25°C		3 fl	2 fl		3 fl			3 fl			3 fl	
J01X	ALTRI ANTIBATTERICI														
J01XX09	DAPTOMICINA	CUBICIN MG.350 - MG.500	conservare in frigorifero tra +2°C e +8°C							2 flac mg.500				10 F. MG.500 - 10 F.MG.350	
J02	ANTIMICOTICI PER USO SISTEMICO														
J02AA01	AMFOTERICINA B Liposomiale	AMBISOME 50 MG F EV	AMBISOME Conservare a temperatura non superiore ai 25°C i flaconcini sigillati di polvere liofilizzata											10 fl	

ATC	Descriz ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE		Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia
				NOVI LIGURE	OVADA	ACQUI TERME			TORTONA			CASALE M.			
J02AA01	ANIDULAFUNGINA	ECALTA 100 mg polv. e 30 ml solv. per conc. per soluz. per inf. uso ev	ECALTA Conservare in frigorifero (2°C-8°C)	10									30		
J02AC03	VORICONAZOLO	VFEND MG.200 F.EV	Non ci sono particolari indicazioni di temperatura										30		
J06	IMMUNOGLOBU-LINE														
J06BA02	IMMUNOGLOBULINE, UMANE NORMALI, PER USO ENDOVENOSO	VENITAL 5 G. ML.100	VENITAL Conservare in frigorifero (2°C - +8°C). Tenere il flacone nell'imballaggio esterno.	5			5			5			5		
J06BB04	IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIEPATITE INTRAMUSC CIRCA 500 UI	IGANTIBE 600 UI - IMMUNOHB5 540 UI - UMAN BIG 540 UI	SPECIALITA' DIVERSE: vedere sulla confezione della specialità aggiudicata		4			4			4			4	
M03	MIORILASSANTI														
M03AC09	BROMURO DI ROCURONIO	ROCURONIO KABI (ESMERON) 100 mg/10 ml soluz. iniett. per ev 10 flaconcini	ROCURONIO KABI Conservare in frigorifero (2°C - 8°C).	1 confezione da 10 fiale da mg.100			1 confezione e da 10 fiale da mg.100			1 confezione e da 10 fiale da mg.100			1 confezione da 10 f da mg.100		
M03CA01	DANTROLENE	DANTRIUM MG.20 polv per infus	DANTRIUM Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Il contenuto del flaconcino deve essere protetto dalla luce diretta e impiegato entro 6 ore dalla preparazione. La soluzione non deve essere esposta a temperature inferiori a 15°C e superiori a 25°C.	vedi Tabella Antidoti											
V03AB	ANTIDOTI														
V03AB35	SUGAMMADEX MG.200 O 500	BRIDION	BRIDION Conservare a temperatura inferiore a 30°C. Non congelare. Tenere il flaconcino nell'astuccio per proteggerlo dalla luce	10 f. da mg.200			10 f. da mg.200			10 f. da mg.200			10 f. da mg.200		

ATC	Descriz ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE		Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia
				NOVI LIGURE		OVADA	ACQUI TERME			TORTONA			CASALE M.		
I reparti di Ostetricia e Ginecologia devono obbligatoriamente avere i seguenti farmaci in quantità congrua. Nei Presidi Ospedalieri ove non è presente il Reparto di Ostetricia e Ginecologia gli stessi farmaci devono essere presenti presso i DEA/PPS e gli stessi, se inutilizzati, a 6 mesi dalla scadenza, dovrebbero essere inviati ai reparti di Ostetricia-Ginecologia e scambiati con confezioni di recente acquisto e con validità lunga, evitando così di ricomprarli alla scadenza.															
H01BB02	Oxitocina	SYNTOCINON 5UI/ML SOL.IN.6F (4 CONFEZIONI)	SYNTOCINON Conservare in frigorifero (2-8°C). Conservare nella confezione originale per proteggere il prodotto dalla luce.			24 F		24 F			24 F				
G02AB01	Metilergometrina	METHERGIN IM IV 6F 1ML 0,2MG/M (UNA CONFEZIONE)	METHERGIN Conservare tra 2°C e 8°C. Non congelare. Tenere le fiale nell'imballaggio esterno per proteggerle dalla luce. Le fiale possono essere conservate per 2 settimane fuori dal frigorifero, ma a temperature non superiori a 25°C.			6 F		6 F			6 F				
G02AD05	Sulprostone	NALADOR INIET 1F 0,5MG 2ML (12 FIALE)	NALADOR Conservare in frigorifero (2°- 8°C). Il prodotto può essere conservato a temperature superiori, purché non oltre i 25°C, per un periodo massimo di 8 giorni.			12 F		12 F			12 F				
G02CA01	Ritodrina	MIOLENE 50 mg/5 ml soluzione per infusione(UNA CONFEZIONE)	MIOLENE Nessuna speciale precauzione per la conservazione			UNA CONFEZIONE		UNA CONFEZIONE			UNA CONFEZIONE				
G02CA49	isoxsuprina cloridrato	VASOSUPRINA ILFI 10 mg/2 ml SOLUZIONE INIETTABILE (2 CONFEZIONI)	VASOSUPRINA Conservare in normali condizioni ambientali			DUE CONFEZIONI		DUE CONFEZIONI			DUE CONFEZIONI				
G02CX01	Atosiban	TRACTOCILE 37,5 mg di atosiban (sotto forma di acetato)	Conservare in frigorifero (2°C - 8°C).Conservare nella confezione originale per proteggerlo dalla luce.			UNA CONFEZIONE		UNA CONFEZIONE			UNA CONFEZIONE				
G02CX01	Atosiban	TRACTOCILE 6,75 mg di atosiban (sotto forma di acetato)				UNA CONFEZIONE		UNA CONFEZIONE			UNA CONFEZIONE				