

COLERA

Epidemiologia	
<i>Casi nel mondo e letalità. (dati OMS)</i>	Circa 200.000/anno (96% in Africa); letalità =1,5-2 % e fino al 41% in gruppi vulnerabili. 2006: 236000 casi (letalità 2.7%); 2007: 177963 casi (letalità 2.3%); 2008: l'epidemia di colera nello Zimbabwe, iniziata nel mese di agosto 2008, ha determinato, solo in quel Paese, 34.306 casi accertati e 1.732 casi mortali (letalità 5.04%) (dati 06/01/2009,OMS).
Rischio nei viaggiatori	<1 caso/100.000 esposti mese; maggiore in operatori sanitari e personale in situazioni di emergenza in aree endemiche, o in corso di epidemia.
Vaccino	
<i>Sicurezza</i>	
<i>Efficacia</i>	Vaccino orale inattivato: Adulti: 76-85% a 6 mesi, 76% a un anno Bambini tra 2 e 6 anni: 100% a 6 mesi, 44% a un anno Non efficace in bambini <2 anni Segnalata azione protettiva del vaccino anche contro la tossina termolabile di <i>E. coli</i> (diarrea del viaggiatore), stimata fino al 60% in alcuni studi; l'indicazione non è attualmente presente nella registrazione EMEA; figura nella registrazione di Canada, Finlandia e Nuova Zelanda.
<i>Impatto della vaccinazione</i>	Rischio nei viaggiatori <1/100.000 esposti mese
Indicazioni alla vaccinazione	
<i>Indicazioni OMS</i>	<i>Viaggiatori diretti verso aree endemiche particolarmente se destinati ad ambienti ad alto rischio (campi profughi, postazioni di emergenza).</i>
<i>Strategia nazionale</i>	
<i>Indicazioni in Piemonte</i>	Offerta ai viaggiatori secondo indicazioni OMS
<i>Definizione e implementazione della strategia di offerta</i>	L'offerta di vaccino nelle situazioni di rischio legato a esposizioni lavorative (viaggio di lavoro in area a rischio) è regolata ai sensi dell'art. 279 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. L'offerta è gratuita per viaggiatori di tutte le età impegnati in progetti di cooperazione/umanitari e per tutti i soggetti di età <18 anni. Per gli altri viaggiatori a rischio, ai sensi dei LEA, il vaccino è offerto a prezzo di costo presso gli Ambulatori di Medicina dei viaggi.
<i>Calendario</i>	2 dosi a distanza di 1-6 settimane (in adulti e bambini di età >6 anni); richiamo dopo 2 anni. 3 dosi a distanza di 1-6 settimane (in bambini da 2 a 6 anni); richiamo dopo 6 mesi.