

DIFTERITE

Epidemiologia*	
<i>Italia (prima della vaccinazione)</i>	12.000 casi nel 1955 (anno di inizio della vaccinazione su larga scala)
<i>Italia</i>	Dal 1994 non sono registrati casi di malattia nei residenti
<i>Piemonte</i>	Dal 1989 non risultano registrati casi nei residenti
Vaccino	
<i>Sicurezza</i>	
<i>Efficacia</i>	95%
<i>Impatto della vaccinazione</i>	Abbattimento dell'incidenza del 100% mantenendo coperture elevate (> 95%)
Priorità	
<i>Letalità</i>	5%-10%, con tassi più elevati nei soggetti di età <5 anni e >40 anni
<i>Sequela permanenti gravi</i>	
<i>Complicanze gravi</i>	Miocarditi, paralisi, neuriti periferiche, nefrite
<i>Ricoveri</i>	100% dei casi
Indicazioni alla vaccinazione	
<i>Obiettivi OMS</i>	Incidenza <0,1/100.000 entro il 2010
<i>Strategia internazionale</i>	Offerta attiva della vaccinazione
<i>Strategia nazionale</i>	Obbligo di vaccinazione nel primo anno di vita; richiamo a 5-6 anni con obiettivo di copertura >95%; richiamo a 11-16 anni con obiettivo di copertura del 90%.
<i>Indicazioni in Piemonte</i>	Obbligo di vaccinazione nel primo anno di vita. Offerta attiva ai nuovi nati nel primo anno di vita. Offerta attiva del richiamo a 5-6 anni (obiettivo: copertura >95%). Offerta attiva del richiamo a 11-16 anni (obiettivo: copertura del 90%); preferibilmente dopo 10 anni dall'ultima somministrazione di DTPa. Raccomandati richiami decennali.
<i>Definizione e implementazione della strategia di offerta</i>	Offerta attiva gratuita ai nuovi nati nel primo anno di vita con Tetano e Pertosse Richiamo con offerta attiva gratuita della 4° dose a 5-6 anni come DTPa-IPV (obiettivo: copertura >95%); Offerta attiva gratuita fra 11 e 16 anni di dtpa Sono raccomandati richiami decennali con dT in offerta gratuita per tutti gli adulti. L'offerta di vaccino nelle situazioni di rischio legato a esposizioni lavorative è regolata ai sensi dell'art. 279 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
<i>Calendario</i>	Ciclo di base 3°, 5°, 11°-13° mese di vita; richiamo a 5-6 anni e a 11-16 anni (preferibilmente dopo 10 anni dall'ultima somministrazione di DTPa).

* Fonte: Ministero della Salute