

FEBBRE TIFOIDE

Epidemiologia*	
<i>Casi nel mondo</i>	16.000.000/anno
<i>Italia</i>	Incidenza 2003: 0,4/100.000; 2004: 0,6/100000; 2006: 0,4/100.000
<i>Piemonte</i>	Incidenza 2003: 0,3/100.000; 2004: 0,05/100.000; 2006: 0,1/100.000 2009: 0.09/100.000
<i>Letalità</i>	<1% nei paesi industrializzati; fino al 10% nei paesi in via di sviluppo
<i>Rischio nei viaggiatori</i>	3/100.000 esposti mese nelle zone tropicali; 30/100.000/esposti mese in India
Vaccino	
<i>Sicurezza</i>	
<i>Efficacia</i>	Vaccino orale e vaccino iniettabile Vi: 50-80%
<i>Impatto della vaccinazione:</i>	Nei viaggiatori: Rischio <1/100.000 esposti mese
Indicazioni alla vaccinazione	
<i>Indicazioni OMS</i>	Viaggiatori diretti in aree ad alto rischio, in particolare coloro che soggiornano per più di un mese in zone endemiche. Viaggiatori diretti in India e nei paesi con ceppi farmaco resistenti (Vietnam, Tajikistan).
<i>Strategia nazionale</i>	
<i>Indicazioni in Piemonte</i>	Offerta ai viaggiatori secondo indicazioni OMS
<i>Definizione e implementazione della strategia di offerta</i>	L'offerta di vaccino nelle situazioni di rischio legato a esposizioni lavorative è regolata ai sensi dell'art. 279 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. L'offerta è gratuita per viaggiatori di tutte le età impegnati in progetti di cooperazione/umanitari e per tutti i soggetti di età <18 anni. Per gli altri viaggiatori a rischio, ai sensi dei LEA, il vaccino è offerto a prezzo di costo presso gli Ambulatori di Medicina dei viaggi.
<i>Calendario</i>	Vaccino orale: tre dosi a giorni alterni. Vaccino iniettabile: una dose (in età >2 anni o >5 anni secondo la preparazione).

* Fonte: Ministero della Salute