

MORBILLO

Epidemiologia*		
<i>Italia</i>	Incidenza in epoca prevaccinale: 1988: 160/100.000; 1993: 29,7/100.000 Incidenza dopo l'avvio di campagne di vaccinazione: 2001: 1,5/100.000; 2002: 31,6/100.000; 2006: 0,97/100.000 Media casi annuali 1998-2002: 5.456 (Incidenza media: 9,6/100.000) Epidemia 2002: Incidenza Campania 204/100.000	
<i>Piemonte</i>	Incidenza 2001: 1,5/100.000; Incidenza anno epidemico 2002: 8,6/100.000 Incidenza anno epidemico 2003: 20,5/100.000 Incidenza 2006: 0,07/100.000 Incidenza anno epidemico 2007: 6,0/100.000 Incidenza anno epidemico 2008: 59,7/100.00	
Vaccino		
<i>Sicurezza</i>	Trombocitopenia	<1/30.000 dosi
	Encefalite	<1/2.500.000 dosi
<i>Efficacia</i>	>90%	
<i>Impatto della vaccinazione</i>	Nelle aree dove sono stati raggiunti gli obiettivi di copertura vaccinale (USA, Finlandia) la malattia è in fase di eliminazione; Tra il 2000 e il 2007 i decessi per morbillo nel mondo si sono ridotti del 74% (da 750000 a 197000).	
Priorità		
<i>Letalità</i>	1/10.000 (10% nei paesi in via di sviluppo)	
<i>Sequela permanenti gravi</i>		
<i>Complicanze gravi</i>	Encefalite acuta 0,2-1/1.000 PESS 1/100.000 Polmonite 6% Convulsioni 6-7% Otite media 7-9%	
<i>Ricoveri Piemonte</i>	Età pediatrica: 230 ricoveri negli anni 1995-99: 70 negli anni 2000-2006; Tutte le età: epidemia 2007: 21 ricoveri (5 in età pediatrica, con un decesso); epidemia 2008: 301 ricoveri (110 in età pediatrica).	
Indicazioni alla vaccinazione		
<i>Obiettivi OMS</i>	Eliminazione entro il 2007 del morbillo endemico dalla Regione Europea e documentata eliminazione entro il 2010.	
<i>Strategia internazionale</i>		
<i>Strategia nazionale</i>	Offerta attiva della vaccinazione MPR a 12-15 mesi (obiettivo: copertura 95%); Seconda dose a 5-6 anni, contemporaneamente alla quarta dose di DTPa. MPR alle reclute all'arruolamento.	

<i>Indicazioni in Piemonte</i>	<p>Raggiungimento con la vaccinazione del 95% della popolazione target; gli unici bambini esclusi dalla campagna sono quelli già vaccinati con due dosi.</p> <p>Raggiungimento della copertura vaccinale del 95% per la prima dose MPR entro i 24 mesi d'età.</p> <p>Recupero alla vaccinazione MPR dei suscettibili nel corso delle Occasioni Opportune (OO) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - quarta dose DTPa a 5-6 anni; - richiamo dT - dtpa, a 11-16 anni.
<i>Definizione e implementazione della strategia di offerta</i>	<p>Offerta attiva gratuita nelle situazioni sopradescritte</p> <p>Offerta gratuita ai suscettibili di tutte le età</p>
<i>Calendario</i>	<p>1° dose a 12-15 mesi; 2° dose a 5-6 anni.</p> <p>Fra le due dosi devono intercorrere almeno 4 settimane.</p>

* Fonte: Ministero della Salute