

PAROTITE

Epidemiologia*	
<i>Italia</i>	Incidenza 1993: 52/100.000; 2002: 10/100.000; 2004: 4,6/100000 2006: 2,5/100.000
<i>Piemonte</i>	Incidenza 2002: 14/100.000; 2004: 4,6/100000 2006: 3,2/100.000 2009: 2,3/100.000
Vaccino	
<i>Sicurezza</i>	Meningoencefalite <1/100.000-300.000 dosi Trombocitopenia <1/30.000 dosi
<i>Efficacia</i>	70-80%
<i>Impatto della vaccinazione</i>	Riduzione di 5 volte dell'incidenza di malattia
Priorità	
<i>Letalità</i>	<1/10.000
<i>Sequela permanenti gravi</i>	Danni al nervo acustico: 5/100.000 (1% di sordità permanente)
<i>Complicanze gravi</i>	Meningite 3/1.000 Orchite 10-35% negli adolescenti Encefalite 1-2/10.000 Pancreatite 2-4%
<i>Ricoveri (in età pediatrica)</i>	258 in Piemonte (2000-2007)
Indicazioni alla vaccinazione	
<i>Obiettivi OMS</i>	Incidenza < 1/100.000 abitanti entro il 2010 nella Regione Europea
<i>Strategia internazionale</i>	
<i>Strategia nazionale</i>	Offerta attiva della vaccinazione MPR a 12-15 mesi (obiettivo: copertura 95%); Seconda dose a 5-6 anni, contemporaneamente alla quarta dose di DTPa.
<i>Indicazioni in Piemonte</i>	Vedi morbillo
<i>Definizione e implementazione della strategia di offerta</i>	Offerta gratuita ai suscettibili di tutte le età.
<i>Calendario</i>	1° dose a 12-15 mesi; 2° dose a 5-6 anni. Fra le due dosi devono intercorrere almeno 4 settimane.

* Fonte: Ministero della Salute