

**FARMACI SALVAVITA DI USO RARO - QUANTITATIVI MINIMI CHE DEVONO ESSERE SEMPRE PRESENTI SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL COORDINATORE  
INFERMIERISTICO**

**ATTENZIONE! SI RICORDA CHE I FARMACI EMODERIVATI E NON, DISPONIBILI A MAGAZZINO PRESSO LA SEDE DI DISTRIBUZIONE INTERNA (GUM O FARMACIA), DEVONO ESSERE RICHIESTI SEMPRE PRESSO TALE SEDE IN ORARIO DI APERTURA DELLA STESSA, TRANNE CHE IN CASO DI NON DISPONIBILITA' O DI URGENZA EFFETTIVA, ONDE EVITARE CHE IL CENTRO DI STOCCAGGIO DI EMERGENZA POSSA RISCHIARE DI RIMANERNE SPROVVISTO.**

**LE QUANTITÀ DEI FARMACI CARDIOVASCOLARI REOPRO 10MG/5ML, AGGRASTAT 250 MCG/ML - 50 ML, ACTILYSE 50 MG, METALYSE 10.000 U MG.50, SIMDAX 2,5 MG/ML - ML.5, VERRANNO CONCORDATE LOCALMENTE COME QUANTITA' CHE DOVRA' ESSERE PRESENTI NELLE SINGOLE FARMACIE/GUM E NELLE RISPETTIVE CARDIOLOGIE DI COMPETENZA TERRITORIALE, ANALOGAMENTE VERRA' CONCORDATA L'UROCHINASI DA DETENERE SIA DOSAGGIO CHE COME QUANTITATIVO IN DIALISI E NELLA CORRISPETTIVA FARMACIA/GUM.**

ATC	Descriz ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE: I farmaci vanno conservati sempre nelle loro confezioni al riparo dalla luce e dall'umidità. Le temperature di conservazione potrebbero essere soggette a variazioni poiché gli stessi prodotti possono essere riformulati cambiando caratteristiche di conservazione e i prodotti aggiudicati e/o disponibili non sono sempre gli stessi. Si raccomanda quindi di controllare sempre la temperatura di conservazione sulle confezioni e porre i farmaci dove indicato sulla/nella confezione.	NOVI LIGURE			OVADA			ACQUI TERME			TORTONA			CASALE M.		
			Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso PS (tra parentesi scorta presso farmacia)	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia		
B01	ANTITROMBOTICI																
B01AB02	ANTITROMBINA III	AT III KEDRION 1000 UI	5000 U				5000 U				5000 U			5000 U		9	
B02	ANTIEMORRAGICI																
B02BD01	COMPLESSO PROTROMBINICO	UMAN COMPLEX DI 500 UI EV	3500 U				3500 U				3500 U			3500 U			
B02BD02	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO	EMOCLOT 1000 U	6000 U				6000 U				6000 U			6000 U			
B02BD02	FATTORE VIII e Von Willebrand	FANHDI 1000 U contiene quantità elevate (non meno di 500 U.I./1000 U.I. FVIII), stand di multimeri di fattore Von Willebrand (VWF) oppure HAEMATE P 1000 UI	4000 U				4000 U				4000 U			4000 U			

ATC	Descriz ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE: I farmaci vanno conservati sempre nelle loro confezioni al riparo dalla luce e dall'umidità. Le temperature di conservazione potrebbero essere soggette a variazioni poiché gli stessi prodotti possono essere riformulati cambiando caratteristiche di conservazione e i prodotti aggiudicati e/o disponibili non sono sempre gli stessi. Si raccomanda quindi di controllare sempre la temperatura di conservazione sulle confezioni e porre i farmaci dove indicato sulla/nella confezione.		Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso PS (tra parentesi scorta presso farmacia)	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia
				NOVI LIGURE			OVADA	ACQUI TERME			TORTONA			CASALE M.		
B02BD04	FATTORE IX COAGULAZIONE SANGUE	AIMAFIX 1000 UI	AIMAFIX Conservare in frigorifero (2°C – 8°C). Non congelare. Tenere il flaconcino nell'imballaggio esterno, per proteggere il medicinale dalla luce.	4000 U				4000 U			4000 U			4000 U		
B02BD08	EPTACOG ALFA ATTIVATO (FATTORE VIIA RICOMBINANTE o rFVIIa)	NOVOSEVEN 2 MG	NOVOSEVEN Conservare polvere e solvente al di sotto di 25°C. Conservare polvere e solvente al riparo dalla luce. Non congelare per prevenire danni al flaconcino di solvente/siringa preriempita.	6				6			6			6		
B05	ALBUMINA															
B05AA01	ALBUMINA UMANA	ALBITAL 20% 50 ML	ALBUMINA UMANA La temperatura di conservazione può variare a seconda della specialità	20			10	20			20			20		
B06	ALTRI AGENTI EMATOLOGICI															
B06AC02	icatibant acetato: PRORITA' 1 (entro 30 minuti)	FIRAZYR 30 mg soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita 3 ml: a <u>NOVE MESI DALLA SCADENZA</u> le fiale vanno inviate alle farmacie di Novi Ligure e Tortona, che le sostituiranno con fiale con periodo di validità più lungo, se disponibili. FIRAZYR Non conservare a temperature superiori ai 25°C. Non congelare.		1 - presso il DEA			1 - presso il PS	1 - presso il DEA			1 - presso il DEA			1 - presso il DEA		
C01C	STIMOLANTI CARDIACI															
C01CA04	DOPAMINA	DOPAMINA HOSPIRA (ex REVIVAN) 200 MG - 5 ML F - ATTENZIONE: I NOMI DEI FARMACI GENERICI DOPAMINA E DOBUTAMINA SONO FACILMENTE CONFONDIBILI: OCCORRE METTERE IN ATTO STRATEGIE PER EVITARE IL CONFONDIMENTO TRA DOPAMINA E DOBUTAMINA // DOPAMINA HOSPIRA Conservare a temperatura non superiore ai 25°C e nella confezione originale		SI	10 f	SI		SI (inoltre scorta presso Farmacia 10 f.)	10 f	SI	10 f		SI	10 f	SI	10 f
C01CA07	DOBUTAMINA	MIOZAC (DOBUTREX) 250 MG./ML.20 EV. F. - ATTENZIONE: I NOMI DEI FARMACI GENERICI DOPAMINA E DOBUTAMINA SONO FACILMENTE CONFONDIBILI: OCCORRE METTERE IN ATTO STRATEGIE PER EVITARE IL CONFONDIMENTO TRA DOPAMINA E DOBUTAMINA - MIOZAC Conservare ad una temperatura inferiore a 25°C e al riparo dalla luce.		SI	10 f	SI		SI (inoltre scorta presso farmacia 10 f)	10 f	SI	10 f		SI	10 f	SI	10 f

ATC	Descriz ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE: I farmaci vanno conservati sempre nelle loro confezioni al riparo dalla luce e dall'umidità. Le temperature di conservazione potrebbero essere soggette a variazioni poiché gli stessi prodotti possono essere riformulati cambiando caratteristiche di conservazione e i prodotti aggiudicati e/o disponibili non sono sempre gli stessi. Si raccomanda quindi di controllare sempre la temperatura di conservazione sulle confezioni e porre i farmaci dove indicato sulla/nella confezione.		Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso PS (tra parentesi scorta presso farmacia)	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia
				<b>NOVI LIGURE</b>			<b>OVADA</b>	<b>ACQUI TERME</b>			<b>TORTONA</b>			<b>CASALE M.</b>		
C01CA19	FENOLDOPAM (MESILATO)	CORLOPAM mg.20	CORLOPAM Conservare ad una temperatura non superiore a 25°C al riparo dalla luce.	3 fiale										10		
H01	VASOPRESSINA, ANALOGHI															
H01BA04	TERLIPRESSINA (ACETATO IDRATO)	GLIPRESSINA (terlipressina acetato 1 mg) EV.F.	GLIPRESSINA Conservare a temperatura non superiore a 25°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce	5 f				5 f.			5 f.			5 fiale		
H03AA	ORMONI TIROIDEI															
H03AA01	Levotiroxina sodica	L-THYROXIN fl 0,5 MG EV (farmaco di importazione dall'estero)	L-THYROXIN Vedere sulla confezione o nel foglietto illustrativo								5 F					
J01	ANTIBATTERICI															
	ANTIBATTERICI PER PROFILASSI ANTI-MENINGITE DA MENINGOCOCCO															
J01MA02	CIPROFLOXACINA	CIPROXIN MG.500 CP	CIPROXIN La specialità non ha una temperatura particolare di conservazione	2 con-fezioni			2 confezioni	2 confezioni			2 confezioni			2 confezioni		
J04AB02	RIFAMPICINA	RIFADIN MG.600 CP	RIFADIN La specialità non ha una temperatura particolare di conservazione	5 con-fezioni			5 confezioni	5 confezioni			5 confezioni			5 confezioni		
J04AB02	RIFAMPICINA	RIFADIN 20 mg/ml sciroppo flacone 60 ml	RIFADIN Conservazione: Non conservare a temperatura superiore ai 25°C	3 fl			2 fl	3 fl			3 fl			3 fl		
J01X	ALTRI ANTIBATTERICI															
J01XX09	DAPTOMICINA	CUBICIN MG.350 - MG.500	conservare in frigorifero tra +2°C e +8°C								2 flac mg.500			10 F. MG.500 - 10 F.MG.350		
J02	ANTIMICOTICI PER USO SISTEMICO															
J02AA01	AMFOTERICINA B Liposomiale	AMBISOME 50 MG F EV	AMBISOME Conservare a temperatura non superiore ai 25°C i flaconcini sigillati di polvere liofilizzata											10 fl		
J02AA01	ANIDULAFUNGINA	ECALTA 100 mg polv. e 30 ml solv. per conc. per soluz. per inf. uso ev	ECALTA Conservare in frigorifero (2°C-8°C)	10										30		

ATC	Descriz ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE: I farmaci vanno conservati sempre nelle loro confezioni al riparo dalla luce e dall'umidità. Le temperature di conservazione potrebbero essere soggette a variazioni poiché gli stessi prodotti possono essere riformulati cambiando caratteristiche di conservazione e i prodotti aggiudicati e/o disponibili non sono sempre gli stessi. Si raccomanda quindi di controllare sempre la temperatura di conservazione sulle confezioni e porre i farmaci dove indicato sulla/nella confezione.		Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso PS (tra parentesi scorta presso farmacia)	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia
				NOVI LIGURE			OVADA	ACQUI TERME			TORTONA			CASALE M.		
J02AC03	VORICONAZOLO	VFEND MG.200 F.EV	Non ci sono particolari indicazioni di temperatura											30		
J06	IMMUNOGLOBULINE															
J06BA02	IMMUNOGLOBULINE UMANE NORMALI, PER USO ENDOVENOSO	VENITAL 5 G. ML.100	VENITAL Conservare in frigorifero (2°C - +8°C). Tenere il flacone nell'imballaggio esterno.	5				5			5			5		
J06BB04	IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIEPATITE INTRAMUSC CIRCA 500 UI	IGANTIBE 600 UI - IMMUNOHS 540 UI - UMAN BIG 540 UI	SPECIALITA' DIVERSE: vedere sulla confezione della specialità aggiudicata		4			4			4				4	
M03	MIORILASSANTI															
M03AC09	BROMURO DI ROCURONIO	ROCURONIO KABI (ESMERON) 100 mg/10 ml soluz. iniett. per ev 10 flaconcini	ROCURONIO KABI Conservare in frigorifero (2°C - 8°C).	1 confezione da 10 fiale da mg.100				1 confezione e da 10 fiale da mg.100			1 confezione e da 10 fiale da mg.100			1 confezione da 10 f da mg.100		
M03CA01	DANTROLENE	DANTRIUM MG.20 polv per infus	DANTRIUM Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Il contenuto del flaconcino deve essere protetto dalla luce diretta e impiegato entro 6 ore dalla preparazione. La soluzione non deve essere esposta a temperature inferiori a 15°C e superiori a 25°C.	vedi Tabella Antidoti												
V03AB	ANTIDOTI															
V03AB35	SUGAMMADEX MG.200 O 500	BRIDION	BRIDION Conservare a temperatura inferiore a 30°C. Non congelare. Tenere il flaconcino nell'astuccio per proteggerlo dalla luce	10 f. da mg.200				10 f. da mg.200			10 f. da mg.200			10 f. da mg.200		
FARMACI SU INDICAZIONE SPECIALISTICA OSTETRICO-GINECOLOGICA: Tali farmaci, se inutilizzati, a 6 mesi dalla scadenza, dovrebbero essere inviati al Reparto di Ostetricia-Ginecologia di Novi e scambiati con confezioni di recente acquisto e con validità lunga, evitando così di ricomprarli alla scadenza.																
H01BB02	Oxitocina	SYNTOCINON 5UI/ML SOL.IN.6F (4 CONFEZIONI)	SYNTOCINON Conservare in frigorifero (2-8°C). Conservare nella confezione originale per proteggere il prodotto dalla luce.								24 F					

ATC	Descriz ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE: I farmaci vanno conservati sempre nelle loro confezioni al riparo dalla luce e dall'umidità. Le temperature di conservazione potrebbero essere soggette a variazioni poiché gli stessi prodotti possono essere riformulati cambiando caratteristiche di conservazione e i prodotti aggiudicati e/o disponibili non sono sempre gli stessi. Si raccomanda quindi di controllare sempre la temperatura di conservazione sulle confezioni e porre i farmaci dove indicato sulla/nella confezione.		Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso PS (tra parentesi scorta presso farmacia)	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia
				NOVI LIGURE			OVADA	ACQUI TERME			TORTONA			CASALE M.		
G02AB01	Metilergometrina	METHERGIN IM IV 6F 1ML 0,2MG/M (UNA CONFEZIONE)	METHERGIN Conservare tra 2°C e 8°C. Non congelare. Tenere le fiale nell'imballaggio esterno per proteggerle dalla luce. Le fiale possono essere conservate per 2 settimane fuori dal frigorifero, ma a temperature non superiori a 25°C.								6 F					
G02AD05	Sulprostone	NALADOR INIET 1F 0,5MG 2ML (12 FIALE)	NALADOR Conservare in frigorifero (2°- 8°C). Il prodotto può essere conservato a temperature superiori, purché non oltre i 25°C, per un periodo massimo di 8 giorni.								12 F					
G02CA01	Ritodrina	MIOLENE 50 mg/5 ml soluzione per infusione(UNA CONFEZIONE)	MIOLENE Nessuna speciale precauzione per la conservazione								UNA CONFEZIONE					
G02CA49	isoxsuprina cloridrato	VASOSUPRINA ILFI 10 mg/2 ml SOLUZIONE INIETTABILE (2 CONFEZIONI)	VASOSUPRINA Conservare in normali condizioni ambientali								DUE CONFEZIONI					
G02CX01	Atosiban	TRACTOCILE 37,5 mg di atosiban (sotto forma di acetato)	Conservare in frigorifero (2°C - 8°C).Conservare nella confezione originale per proteggerlo dalla luce.								UNA CONFEZIONE					
G02CX01	Atosiban	TRACTOCILE 6,75 mg di atosiban (sotto forma di acetato)										UNA CONFEZIONE				