

Medicazione di un CVC tipo PICC nell'adulto e corretta gestione della linea infusionale

Come sostituire la medicazione di un catetere PICC

PAZIENTE ADULTO

RIMOZIONE DELLA VECCHIA MEDICAZIONE



1

Igiene delle mani praticata con gel idroalcolico e guanti puliti



2

Ispezione/palpazione del sito di emergenza e rimozione membrana trasparente e Biopatch



3

Rimozione dello Statlock



4

Attenzione: stabilizzare il catetere con lo strip adesivo (contenuto nella confezione dello Statlock)



APPOSIZIONE DELLA NUOVA MEDICAZIONE



1

Igiene delle mani praticata con gel idroalcolico e guanti sterili



2

Disinfezione con Clorexidina 2% in alcol (30" di applicazione + 30" di attesa)



3

Preparazione della cute allo Statlock



4

Apposizione dello Statlock



5

Apposizione del Biopatch



6

Apposizione IV300



7

Medicazione ultimata



8

Data della medicazione



GESTIONE DELLA LINEA INFUSIONALE VENOSA

linee guida INS 2016, CDC 2011, epic3 2014, SHEA 2014, INS 2021



Medicazione ultimata con data di esecuzione



Distacco del connettore valvolato e del port protector



Preparazione della pulizia dell'hub del catetere




Strofinio dell'hub del catetere (almeno 15 sec + 15 sec di asciugatura)



Preparazione del NFC



Collegamento del NFC all'hub del catetere



Apertura della Posiflush XS da 10 ml



Lavaggio pulsato con Posiflush XS da 10 ml




Apertura ed apposizione del Purehub



Cambio della medicazione e gestione della linea infusionale ultimate

Infermieristico
Team Accessi
Vascolari
ASL AL-Casale Monferrato



teaminfermieristicoaccessivascolari@aslal.it

0142.434490