

EMIVITA FARMACI UTILIZZATI PER PROFILASSI PERIOPERATORIA

LE SEGUENTI INDICAZIONI SI RIFERISCONO A PAZIENTI NORMOPESO CON FUNZIONE RENALE DI NORMA.

Si rimanda ai singoli paragrafi della procedura per la valutazione complessiva della profilassi peri-operatoria

FARMACO	EMIVITA FARMACO (ore)	POSOLOGIA/DILUIZIONE	ORARIO ANTIBIOTICO (prima dell'incisione cute)	DOSE INTRAOPERATORIA	SE ALLERGIA AI BETA-LATTAMICI	FARMACO II SCELTA
CEFAZOLINA	1.9	2g + fisiol 100cc	30-60min	1g ogni 2h dalla 2°h o 2g ogni 4h dalla 4° ora	CLINDAMICINA o COTRIMOXAZOLO	CEFUROXIMA
CEFUROXIMA	1.5	2g + fisiol 100cc	30-60min	1g ogni 2h dalla 2°h o 2g ogni 4h dalla 4° ora	CLINDAMICINA	CEFAZOLINA
CEFOXITINA	0.9	2g + fisiol 100cc	30-60min	1g ogni 2h dalla 2°h o 2g ogni 4h dalla 4° ora	CLINDAMICINA	CEFAZOLINA+METRONIDAZOLO
VANCOMICINA	6	1g + fisiol 250cc	60-120min	500 mg a 6-8h	CLINDAMICINA o COTRIMOXAZOLO	CLINDAMICINA o COTRIMOXAZOLO
CLINDAMICINA	2-3	600mg + fisiol 100cc	30-60min	600 mg a 4-6h		COTRIMOXAZOLO
GENTAMICINA	2-3	3mg/kg + fisiol 250cc	30-60min	1-2mg/kg a 6h		
AMPICILLINA/SULBACTAM	1	3g + fisiol 100cc	30-60min	3 g a 2-3h	CLINDAMICINA+GENTAMICINA	
AMOXICILLINA/ACIDO CLAVULANICO	1	2.2 gr + fisiol 100cc	30-60min	2.2 gr a 2-3h	VANCOMICINA	
METRONIDAZOLO	6-14	500mg	30-60min	Non indicata		
COTRIMOXAZOLO	10-11	160/800 mg + fisiol 100cc	30-60min	Non indicata		CLINDAMICINA

INDICAZIONI PER IL PAZIENTE OBESO L'obesità è definita in presenza di un peso corporeo > 20% del peso ideale (Ideal BW) o un BMI > 30. Solo per alcuni antibiotici è stata valutata la farmacocinetica nel paziente obeso. Per Vancomicina 15-20mg/kg in base al peso attuale (singola dose massima 2g). Per tutti gli altri si rimanda alla tabella sovrastante.