

**PROMEMORIA DELLE PRINCIPALI PRECAUZIONI DA ADOTTARE IN CASO
DI MALATTIE TRASMISSIBILI**

Paziente (cognome e nome) _____ Camera/letto n. ____

Informazione	<ul style="list-style-type: none"> • Personale • Parenti/badanti • Paziente • Personale Ditta Pulizie
Collocazione paziente	<ul style="list-style-type: none"> • Camera singola o isolamento funzionale • Coorte con paziente colonizzato o infetto con lo stesso microrganismo • In camera con paziente a basso rischio di infezione o in fase di dimissione
Predisposizione di:	<ul style="list-style-type: none"> • Cartello di "accesso controllato" sulla porta della camera • Carrello dotato di gel idroalcolico, camici, guanti monouso non sterili, mascherine, occhiali (se necessari) • Contenitore per Rifiuti Sanitari Pericolosi a rischio infettivo • Attrezzature dedicate: fonendoscopio, sfigmomanometro, padelle, pappagalli, vassoi per il vitto, ecc...
Principali misure assistenziali	<p align="center"><u>Prima di assistere il paziente</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • eseguire l'igiene delle mani • indossare camici e DPI adeguati a seconda della tipologia di trasmissione <p align="center"><u>Dopo il contatto con il paziente</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • rimuovere i DPI e il camice prima di uscire dalla camera ed eliminarli nel contenitore per Rifiuti Sanitari Pericolosi • eseguire l'igiene delle mani <p align="center"><u>Igiene ambientale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Disinfettare le attrezzature non dedicate prima di utilizzarle su un altro paziente • Pulire e disinfettare le attrezzature dedicate in caso di contaminazione con materiale biologico e alla dimissione • Detergere/disinfettare con cloroderivati 1000 ppm tutte le superfici maggiormente toccate da pazienti o operatori
Gestione della biancheria	<ul style="list-style-type: none"> • Sostituire giornalmente, introdurre direttamente negli appositi sacchi (idrosolubile + rosso) conservati all'interno della camera
Trasferimenti paziente	<ul style="list-style-type: none"> • Ridurre al minimo gli spostamenti fuori dalla camera; in caso sia necessario, informare gli operatori del reparto/servizio in cui il paziente deve essere condotto sulle precauzioni da adottare