

2 	Procedura Generale Aziendale PO GC-QU-RIC/RI ASL AL 004 Raccomandazioni per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (ISC)	Mod. PG GC-QU- RIC ASL AL 004/02 (rev. 0)
--	--	---

MEDICAZIONE FERITA CHIRURGICA AL TERMINE DELL'INTERVENTO

- 1) Al termine della sutura, lavare la ferita con fisiologica sterile
- 2) Eseguire antisepsi della ferita con tecnica asettica: prelevare i tamponi sterili imbibiti di antisettico (iodopovidone 7,5 -10% in soluzione acquosa o con Ipoclorito al 0.055%)
Eseguire antisepsi con movimenti dall'alto verso il basso della ferita iniziando dal centro e continuando verso l'esterno con guanti e pinza sterili.
Usare un tampone diverso ad ogni passaggio ed eliminarlo dopo l'uso
Eliminare i tamponi in un contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo
Applicare la medicazione con tecnica no-touch facendo attenzione che aderisca bene alla cute
- 3) **Lavarsi le mani** prima e dopo aver effettuato la medicazione o aver toccato il sito chirurgico qualora la medicazione non venga eseguito da operatori "sterili".

MEDICAZIONI FERITA CHIRURGICA POST INTERVENTO

Raccomandazioni:

- 1) educare il paziente a segnalare eventuali segni e sintomi che potrebbero presentarsi (dolore, gonfiore, sanguinamento) nella zona relativa alla ferita
- 2) rispettare la privacy del paziente durante la procedura
- 3) eseguire le medicazioni in ambiente e/o condizioni che garantiscano le norme di sicurezza igienica (es. non contemporaneamente ad altre attività, in ambiente pulito, con biancheria pulita, ecc...)
- 4) privilegiare le confezioni di antisettici monouso o in formati ridotti (100 e 250 ml) al fine di limitare il rischio di contaminazione della soluzione stessa
- 5) riportare sempre la data di apertura sul flacone degli antisettici
- 6) non utilizzare soluzione antisettica con PVP-iodio su ferite chirurgiche di interventi della tiroide o in pazienti allergici a questo principio attivo
- 7) procedere al lavaggio antisettico o a frizione alcolica delle mani ad inizio e termine della gestione delle medicazioni di ferite chirurgiche e tra una medicazione a l'altra su stesso paziente

2 	Procedura Generale Aziendale PO GC-QU-RIC/RI ASL AL 004 Raccomandazioni per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (ISC)	Mod. PG GC-QU- RIC ASL AL 004/02 (rev. 0)
--	---	---

- 8) gli operatori che eseguono le medicazioni non devono indossare anelli, bracciali, monili vari e unghie artificiali
- 9) nel caso di esecuzione di esami colturali sulla ferita chirurgica è necessario ottenere un aspirato del materiale per esame colturale; non è più raccomandata l'esecuzione di un tampone.

Definizioni:

- tecnica "touch": la medicazione viene eseguita con l'utilizzo di guanti monouso sterili che toccano direttamente la ferita
- tecnica "no touch": la medicazione viene eseguita indossando guanti monouso non sterili e con l'utilizzo di dispositivi medici sterili

Procedura:

- 1) assicurarsi di avere sul carrello tutto il materiale necessario
- 2) informare il paziente sulla procedura a cui verrà sottoposto
- 3) praticare l'igiene delle mani con gel alcolico
- 4) indossare guanti monouso non sterili
- 5) rimuovere la medicazione delicatamente (se necessario inumidire i cerotti con soluzione fisiologica sterile) e smaltirla nell'apposito contenitore
- 6) rimuovere i guanti
- 7) eseguire igiene delle mani con gel alcolico
- 8) indossare guanti sterili per tecnica "touch" o quelli non sterili per la tecnica "no touch"
- 9) detergere la ferita con soluzione fisiologica sterile o acqua ossigenata se presenti consistenti residui ematici. Pulire dall'alto verso il basso e verso l'esterno della sutura, senza mai ritornare indietro; ripetere la manovra con un altro batuffolo di garza sterile per trattare l'altro lato della sutura.
- 10) valutare l'eventuale rimozione dei punti di sutura e drenaggi
- 11) disinfettare la ferita secondo la tecnica di cui al punto 9 utilizzando l'antisettico e lasciandolo agire il tempo necessario;

2 	Procedura Generale Aziendale PO GC-QU-RIC/RI ASL AL 004 Raccomandazioni per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (ISC)	Mod. PG GC-QU- RIC ASL AL 004/02 (rev. 0)
--	---	---

- 12) eseguire medicazione a piatto utilizzando cerotti sterili già pronti o compresse di garza sterile e cerotto in TNT se la ferita è secernente;
- 13) rimuovere i guanti ed effettuare l'igiene delle mani;
- 14) eliminare i rifiuti secondo il protocollo aziendale vigente;
- 15) ricondizionare l'ambiente
- 16) ripristinare il materiale utilizzato e riordinare il carrello
- 17) decontaminare e trattare i ferri chirurgici pluriuso eventualmente utilizzati come da protocollo aziendale
- 18) eseguire l'igiene delle mani al termine della procedura
- 19) registrare la procedura eseguita in cartella medica e/o infermieristica, segnalando eventuali anomalie o segni di flogosi.
- 20) registrare la tracciabilità di eventuali dispositivi sterili utilizzati per la medicazione apponendo l'etichetta adesiva sull'apposito modulo aziendale