

FARMACI SALVAVITA DI USO RARO - QUANTITATIVI MINIMI CHE DEVONO ESSERE SEMPRE PRESENTI SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL COORDINATORE INFERMIERISTICO

ATTENZIONE! SI RICORDA CHE I FARMACI EMODERIVATI E NON, DISPONIBILI A MAGAZZINO PRESSO LA SEDE DI DISTRIBUZIONE INTERNA (GUM O FARMACIA), DEVONO ESSERE RICHIESTI SEMPRE PRESSO TALE SEDE IN ORARIO DI APERTURA DELLA STESSA, TRANNE CHE IN CASO DI NON DISPONIBILITA' O DI URGENZA EFFETTIVA, ONDE EVITARE CHE IL CENTRO DI STOCCAGGIO DI EMERGENZA POSSA RISCHIARE DI RIMANERNE SPROVVISTO.

SI RACCOMANDA AI REPARTI O SERVIZI INTERESSATI DI STAMPARE UNA COPIA AGGIORNATA E TENERLA BENE IN VISTA A DISPOSIZIONE IN CASO DI EMERGENZA, INSIEME A QUELLA DEGLI ANTIDOTI

AGGRASTAT 250 MCG/ML-50 ML 2 FLACONI in CARDIOLOGIA // SIMDAX 2.5 MG/ML - 5 ML UN FLACONE in RIANIMAZIONE // UROCHINASI 20 FLACONI in DIALISI // ATTENZIONE I DEA E I PPI (Punti di Primo Intervento cioè il Pronto Soccorso Ovada) DEVONO AVERE PER L'IMA: TICAGRELOR 90 MG (BRILIQUE) - CLOPIDOGREL 75 MG - PRASUGREL 10 MG (EFIENT)

ATC	Descriz ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Blocco Operatorio	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocchi Operatori (BLOCCO del Primo Piano e BLOCCO del Secondo Piano)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Ciascun Blocco Operatorio (2 BLOCCHI di cui uno per Ostetricia Ginecologia)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	
			NOVI LIGURE				OVADA	ACQUI TERME				TORTONA			CASALE M.						
B01	ANTITROMBOTICI																				
B01AD02	ALTEPLASI	ACTILYSE ev 1 flac. liof. 50 mg		4 fl				4 F.				4 F.					4 F				
B01AB02	ANTITROMBINA III	AT III KEDRION 1000 UI				9000 U						5000 U						5000 U			9
B02	ANTIEMORRAGICI																				
B02BD01	COMPLESSO PROTROMBINICO	KEDCOM (UMAN COMPLEX DI) 500 UI EV : contiene solo 3 fattori della coagulazione (IX, II, X)				3500 U						3500 U						3500 U			
B02BD02	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO	KLOTT (EMOCLOT) 1000 U				6000 U						6000 U						6000 U			
B02BD02	FATTORE VIII e Von Willebrand	HAEMATE P 1000 UI - 1000 UI del fattore VIII umano della coagulazione (FVIII) e 2400 UI del fattore von Willebrand umano (VWF)				8000 U						8000 U						8000 U			

ATC	Descriz ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Blocco Operatorio	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocchi Operatori (BLOCCO del Primo Piano e BLOCCO del Secondo Piano)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Ciascun Blocco Operatorio (2 BLOCCHI di cui uno per Ostetricia Ginecologia)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia
			NOVI LIGURE			OVADA	ACQUI TERME					TORTONA			CASALE M.					
B02BD04	FATTORE IX COAGULAZIONE SANGUE	IXED (AIMAFIX) 1000 UI	IXED (AIMAFIX) Conservare in frigorifero (da +2°C a +8°C). Non congelare. Tenere il flaconcino nell'imballaggio esterno, per proteggere il medicinale dalla luce.	4000 U				4000 U				4000 U				4000 U				
B02BD08	EPTACOG ALFA ATTIVATO (FATTORE VIIIA RICOMBINANTE o rFVIIa): Attenzione: L'uso contemporaneo di concentrati del complesso protrombinico, attivati e non, deve essere evitato.	NOVOSEVEN 2 MG	NOVOSEVEN Conservare polvere e solvente al di sotto di 25°C. Conservare polvere e solvente al riparo dalla luce. Non congelare per prevenire danni al flaconcino di solvente/siringa preriempita.	6				6				6				6				
B05	ALBUMINA																			
B05AA01	ALBUMINA UMANA	ALBITAL 20% 50 ML	ALBUMINA UMANA La temperatura di conservazione può variare a seconda della specialità	20			10	20				20				20				
B06	ALTRI AGENTI EMATOLOGICI																			
B06AC02	icatibant acetato: PRORITA' 1 (entro 30 minuti)	FIRAZYR 30 mg soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita 3 ml: <u>ad almeno NOVE MESI DALLA SCADENZA</u> le fiale vanno inviate alle farmacie di Novi Ligure e Tortona, che le sostituiranno con fiale con periodo di validità più lungo, se disponibili. FIRAZYR Non conservare a temperature superiori ai 25°C. Non congelare.				1 - presso il DEA	1 - presso il PS			1 - presso il DEA				1 - presso il DEA					1 - presso il DEA	
		Segue																		

ATC	Descriz ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Blocco Operatorio	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocchi Operatori (BLOCCO del Primo Piano e BLOCCO del Secondo Piano)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Ciascun Blocco Operatorio (2 BLOCCHI di cui uno per Ostetricia Ginecologia)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	
			NOVI LIGURE			OVADA	ACQUI TERME			TORTONA			CASALE M.								
C01C	STIMOLANTI CARDIACI																				
C01CA04	DOPAMINA	DOPAMINA HOSPIRA (ex REVIVAN) 200 MG - 5 ML F - ATTENZIONE: I NOMI DEI FARMACI GENERICI DOPAMINA E DOBUTAMINA SONO FACILMENTE CONFONDIBILI: OCCORRE METTERE IN ATTO STRATEGIE PER EVITARE IL CONFONDIMENTO TRA DOPAMINA E DOBUTAMINA // DOPAMINA HOSPIRA Conservare a temperatura non superiore ai 25°C e nella confezione originale				SI	SI			SI	10 f			SI	10 f				SI	10 f	
C01CA07	DOBUTAMINA	MIOZAC (DOBUTREX) 250 MG./ML.20 EV. F. - ATTENZIONE: I NOMI DEI FARMACI GENERICI DOPAMINA E DOBUTAMINA SONO FACILMENTE CONFONDIBILI: OCCORRE METTERE IN ATTO STRATEGIE PER EVITARE IL CONFONDIMENTO TRA DOPAMINA E DOBUTAMINA - MIOZAC Conservare ad una temperatura inferiore a 25°C e al riparo dalla luce.				SI	SI			SI	10 f			SI	10 f				SI	10 f	
C01CA19	FENOLDOPAM (MESILATO)	CORLOPAM mg.20	CORLOPAM Conservare ad una temperatura non superiore a 25°C al riparo dalla luce.	3 fiale												10					
H01	VASOPRESSINA, ANALOGHI																				
H01BA04	TERLIPRESSINA (ACETATO IDRATO)	VARIQUEL (Glipressina) 1 mg) EV.F.	GLIPRESSINA Conservare a temperatura non superiore a 25°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce			5 f				5 f.				5 f.		5 fiale					
H03AA	ORMONI TIROIDEI																				
H03AA01	LEVOTIROXINA	L-THYROXIN fi 0,2 MG (farmaco di importazione dall'estero)	L-TYROXINE Vedere sulla confezione o nel foglietto illustrativo									12 F (2 scatole da 6 fiale)									
J01	ANTIBATTERICI																				
ANTIBATTERICI PER PROFILASSI ANTI-MENINGITE DA MENINGOCOCCO																					
J01MA02	CIPROFLOXACINA	CIPROXIN MG.500 CP	CIPROXIN La specialità non ha una temperatura particolare di conservazione			2 confezioni	2 confezioni			2 confezioni				2 confezioni						2 confezioni	
J04AB02	RIFAMPICINA	RIFADIN MG.300 CP	RIFADIN La specialità non ha una temperatura particolare di conservazione			10 confezioni	10 confezioni			10 confezioni				10 confezioni						10 confezioni	

ATC	Descriz ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE		Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Blocco Operatorio	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocchi Operatori (BLOCCO del Primo Piano e BLOCCO del Secondo Piano)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Ciascun Blocco Operatorio (2 BLOCCHI di cui uno per Ostetricia Ginecologia)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	
				NOVI LIGURE				OVADA		ACQUI TERME				TORTONA				CASALE M.				
J04AB02	RIFAMPICINA	RIFADIN 20 mg/ml sciroppo flacone 60 ml	RIFADIN Conservazione: Non conservare a temperatura superiore ai 25°C				3 fl	2 fl			3 fl				3 fl						3 fl	
J01X	ALTRI ANTIBATTERICI																					
J01XX09	DAPTOMICINA	CUBICIN MG.350 – MG.500	conservare in frigorifero tra +2°C e +8°C										2 flac mg.500						10 F. MG.500 - 10 F.MG.350			
J02	ANTIMICOTICI PER USO SISTEMICO																					
J02AA01	AMFOTERICINA B Liposomiale	AMBISOME 50 MG F EV	AMBISOME Conservare a temperatura non superiore ai 25°C i flaconcini sigillati di polvere liofilizzata																10 fl			
J02AA01	ANIDULAFUNGINA	ECALTA 100 mg polv. e 30 ml solv. per conc. per soluz. per inf. uso ev	ECALTA Conservare in frigorifero (2°C-8°C)	10															30			
J02AC03	VORICONAZOLO	VFEND MG.200 F.EV	Non ci sono particolari indicazioni di temperatura																30			
J06	IMMUNOGLOBU-LINE																					
J06BA02	IMMUNOGLOBULINE, UMANE NORMALI, PER USO ENDOVENOSO	VENITAL 5 G. ML.100	VENITAL Conservare in frigorifero (2°C - +8°C). Tenere il flacone nell'imballaggio esterno.	5					5					5					5			
J06BB04	IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIEPATITE INTRAMUSC CIRCA 500 UI	IGANTIBE 600 UI - IMMUNOHS 540 UI - UMAN BIG 540 UI	SPECIALITA' DIVERSE: vedere sulla confezione della specialità aggiudicata				4				4				4						4	
M03	MIORILASSANTI																					
M03CA01	DANTROLENE	DANTRIUM MG.20 polv per infus	DANTRIUM Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Il contenuto del flaconcino deve essere protetto dalla luce diretta e impiegato entro 6 ore dalla preparazione. La soluzione non deve essere esposta a temperature inferiori a 15°C e superiori a 25°C.																			
	segue																					

vedi Tabella Antidoti

ATC	Descriz ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Blocco Operatorio	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocchi Operatori (BLOCCO del Primo Piano e BLOCCO del Secondo Piano)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Ciascun Blocco Operatorio (2 BLOCCHI di cui uno per Ostetricia Ginecologia)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia
			NOVI LIGURE				OVADA	ACQUI TERME				TORTONA			CASALE M.					
ROCURONIO E IL SUO ANTIDOTO																				
M03AC09	ROCURONIO:																			
M03AC09	BROMURO DI ROCURONIO	ROCURONIO 50 mg /5 ml in confezione da 10 Fiale (una confezione = 500 mg)	ROCURONIO KABI Conservare in frigorifero (2°C - 8°C).	20 fiale da mg.50		20 fiale da mg.50			20 fiale da mg.50				40 fiale da mg.50 - 20 fiale per piano			20 f da mg.50		40 f da mg.50 - 20 fiale per blocco		
V03AB	ANTIDOTO DEL ROCURONIO:																			
V03AB35	SUGAMMADEX	BRIDION mg.200 / 2 ml - 10 fiale (una confezione = 2000 mg)	BRIDION Conservare a temperatura inferiore a 30°C. Non congelare. Al riparo dalla luce	10 f. da mg.200 (una confezione)		10 f. da mg.200 (una confezione)			10 f. da mg.200 (una confezione)				20 f. da mg.200 (DUE CONFEZIONI) di cui 10 f (una confezione) per piano			10 f. da mg.200 (una confezione)		20 f. da mg.200 (DUE confezioni) di cui 10 f (una confezione) per blocco		
	segue																			

ATC	Descriz ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Blocco Operatorio	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocchi Operatori (BLOCCO del Primo Piano e BLOCCO del Secondo Piano)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Ciascun Blocco Operatorio (2 BLOCCHI di cui uno per Ostetricia Ginecologia)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	
			NOVI LIGURE				OVADA	ACQUI TERME				TORTONA				CASALE M.					
FARMACI D'EMERGENZA IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA																					

I reparti di Ostetricia e Ginecologia devono obbligatoriamente avere i seguenti farmaci in quantità congrua. Nei Presidi Ospedalieri ove non è presente il Reparto di Ostetricia e Ginecologia gli stessi farmaci devono essere presenti presso i DEA/PPS e gli stessi, se inutilizzati, a 6 mesi dalla scadenza, dovrebbero essere inviati ai reparti di Ostetricia-Ginecologia e scambiati con confezioni di recente acquisto e con validità lunga, evitando così di ricomprarli alla scadenza.

H01BB02	Oxitocina	SYNTOCINON 5U/ML SOL.IN.6F (4 CONFEZIONI)	SYNTOCINON Conservare in frigorifero (2-8°C). Conservare nella confezione originale per proteggere il prodotto dalla luce.							24 F										24 F	
G02AB01	Metilergometrina	METHERGIN IM IV 6F 1ML 0,2MG/M (UNA CONFEZIONE)	METHERGIN Conservare tra 2°C e 8°C. Non congelare. Tenere le fiale nell'imballaggio esterno per proteggerle dalla luce. Le fiale possono essere conservate per 2 settimane fuori dal frigorifero, ma a temperature non superiori a 25°C.							6 F										6 F	
G02AD05	Sulprostone	NALADOR INIET 1F 0,5MG 2ML (12 FIALE)	NALADOR Conservare in frigorifero (2°-8°C). Il prodotto può essere conservato a temperature superiori, purché non oltre i 25°C, per un periodo massimo di 8 giorni.							12 F										12 F	
G02CA01	Ritodrina	MIOLENE 50 mg/5 ml soluzione per infusione(UNA CONFEZIONE)	MIOLENE Nessuna speciale precauzione per la conservazione							UNA CONFEZIONE										UNA CONFEZIONE	
G02CA49	isoxsuprina cloridrato	VASOSUPRINA ILFI 10 mg/2 ml SOLUZIONE INIETTABILE (2 CONFEZIONI)	VASOSUPRINA Conservare in normali condizioni ambientali							DUE CONFEZIONI										DUE CONFEZIONI	
G02CX01	Atosiban	TRACTOCILE 37,5 mg di atosiban (sotto forma di acetato)	Conservare in frigorifero (2°C - 8°C).Conservare nella confezione originale per proteggerlo dalla luce.							UNA CONFEZIONE										DUE CONFEZIONI	
G02CX01	Atosiban	TRACTOCILE 6,75 mg di atosiban (sotto forma di acetato)		UNA CONFEZIONE							DUE CONFEZIONI									UNA CONFEZIONE	