

FARMACI SALVAVITA DI USO RARO - QUANTITATIVI MINIMI CHE DEVONO ESSERE SEMPRE PRESENTI SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL COORDINATORE INFERMIERISTICO

ATTENZIONE! SI RICORDA CHE I FARMACI EMODERIVATI E NON, DISPONIBILI A MAGAZZINO PRESSO LA SEDE DI DISTRIBUZIONE INTERNA (GUM O FARMACIA), DEVONO ESSERE RICHIESTI SEMPRE PRESSO TALE SEDE IN ORARIO DI APERTURA DELLA STESSA, TRANNE CHE IN CASO DI NON DISPONIBILITA' O DI URGENZA EFFETTIVA, ONDE EVITARE CHE IL CENTRO DI STOCCAGGIO DI EMERGENZA POSSA RISCHIARE DI RIMANERNE SPROVVISTO.

SI RACCOMANDA AI REPARTI O SERVIZI INTERESSATI DI STAMPARE UNA COPIA AGGIORNATA E TENERLA BENE IN VISTA A DISPOSIZIONE IN CASO DI EMERGENZA, INSIEME A QUELLA DEGLI ANTIDOTI

ASGRASTAT 250 MCG/ML - 50 ML 2 FLACONI in CARDIOLOGIA // SMDAX 2,5 MGMTL - 5 ML UN FLACONE in RIANIMAZIONE // UROCHINASI 20 FLACONI in DIALISI // ATTENZIONE! IDEA E I PPI (Punti di Primo Intervento cioè il Pronto Soccorso Orvada) DEVONO AVERE PER l'IMA: TICAGRELOR 90 MG (BRILIQUE) - CLOPIDOGREL 75 MG - PRASUGREL 10 MG (EFIENT)

ATC	Descriz ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE	Scorta presso Riannazione	Scorta presso Neurologia	NOVI LIGURE	Scorta presso Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Riannazione	ACQUI TERME	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Riannazione	Scorta presso Blocci Operatori (BLOCCO del Primo Piano e BLOCCO del Secondo Piano)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Riannazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Claustrum Blocco Operatorio (2 BLOCCHI al cui uno per Obstetrica Ginecologica)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	
			NOVI LIGURE			ORVADA			ACQUI TERME			TORTONA			CASALE M.						
B01	ANTITROMBOTICI																				
B01AD02	ALTEPLASI	ACTILYSE ev 1 flac. liof. 50 mg Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.		4 fl					4 F.			4 F.					4 F.				
B01AB02	ANTITROMBINA III	AT III KEDRION 1000 UI AT III KEDRION: Conservare in frigorifero (da +2°C a +8°C). Non congelare. Tenere il flaconcino nell'imballaggio esterno, per proteggere il medicinale dalla luce.	9000 U						5000 U			5000 U					5000 U				9
B02	ANTIEMORRAGICI																				
B02BD01	COMPLESSO PROTROMBINICO	KEDCOM (UMAN COMPLEX DI) 500 UI EV : contiene solo 3 fattori della coagulazione (IX, II, X) KEDCOM (UMAN COMPLEX) Conservare in frigorifero (da +2°C a +8°C). Tenere il flaconcino nell'imballaggio esterno, per proteggere il medicinale dalla luce. Non congelare.	2500 U						2500 U			2500 U					2500 U				
B02BD01	FATTORE IX, II, VII E X DI COAGULAZIONE IN ASSOCIAZIONE	CONFIDEX 1000 U/FL POLV+FL 40ML: contiene 4 fattori della coagulazione (IX, II, VII, X) CONFIDEX Non conservare a temperatura superiore a 25°C. Non congelare. Tenere il flaconcino nella scatola esterna per proteggerlo dalla luce.	5000 UI						5000 UI			5000 UI					5000 UI				
B02BD02	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO	KLOTT (EMOCLOT) 1000 U KLOTT (EMOCLOT) Conservare in frigorifero (da +2°C a +8°C). Non congelare. Tenere il flaconcino nell'imballaggio esterno, per proteggere il medicinale dalla luce.	6000 U						6000 U			6000 U					6000 U				
B02B02	FATTORE VIII e Von Willebrand	HAEMATE P 1000 UI - 1000 UI del fattore VIII umano della coagulazione (FVIII) e 2400 UI del fattore von Willebrand umano (VWF) HAEMATE P Haemate P 500/1000 non deve essere conservato ad una temperatura superiore a +25°C. Non congelare. Conservare il contenuto nella confezione.	8000 U						8000 U			8000 U					8000 U				
B02B03	INIBITORE BYPASSANTE L'ATTIVITA' DEL FATTORE VIII	FEIBA FL 1000UF+BAJJECT II HF - COMPLESSO PROTROMBINICO ANTIEMOFILICO UMANO ATTIVA FEIBA FL Conservare a temperatura inferiore a 25°C. Non congelare. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.	2000 U														2000 U				

ATC	Descriz. ATC	DESCRIZIONE SPECIALITA' E CONSERVAZIONE	NOVI LIGURE				OVADA	ACQUI TERME			TORTONA			CASALE M.			
			Scorta presso Farmazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Blocco Operatorio	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Farmazione	Scorta presso Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Farmazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Clinica Neuro Operatorio (2 BLOCCHI di soli piano per Clinica Oncologica)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	
J04AB02	RIFAMPICINA	RIFADIN 20 mg/ml sciroppo flacone 60 ml				3 fl	2 fl			3 fl						3 fl	
J01X	ALTRI ANTIBATTERICI																
J01XX09	DAPDOMICINA	CUBICIN 500 MG E CUBICIN 350 MG	conservare in frigorifero tra +2°C e +8°C	3 FL + 3 FL				3 FL + 3 FL			3 FL + 3 FL			3 FL + 3 FL			
J02	ANTIMICOTICI PER USO SISTEMICO																
J02AA01	AMFOTERICINA B Liposomiale	AMBISOME 50 MG F EV	AMBISOME Conservare a temperatura non superiore ai 25°C i flaconcini sigillati di polvere liofilizzata	21 FL				21 FL			21 FL			21 FL			
J02AA01	ANIDULAFUNGINA	ECALTA 100 mg polv. e 30 ml solv. per conc. per soluz. per inf. uso ev	ECALTA Conservare in frigorifero (2°C-8°C)	4 FL				4 FL			4 FL			4 FL			
J02AC03	VORICONAZOLO	VFEND MG.200 F.EV	Non ci sono particolari indicazioni di temperatura	8 FL				8 FL			8 FL			8 FL			
J06	IMMUNOGLOBULINE																
J06BA02	IMMUNOGLOBULINE, UMANE NORMALI, PER USO ENDOVENOSO	IG EV 5 G. ML.100 (es. Venital, Igvena, Flebogamma)	IG EV Conservare in frigorifero (2°C - +8°C). Tenere il flacone nell'imballaggio esterno.	5				5			5			5			
J06BB04	IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIEPATITE INTRAMUSC CIRCA 500 UI	IGANTIBE 600 UI - IMMUNOHIS 540 UI - UMAN BIG 540 UI	SPECIALITA' DIVERSE: vedere sulla confezione della specialità aggiudicata	4				4			4			4			
M03	MIORLASSANTI																
M03CA01	DANTROLENE	DANTRIUM MG.20 polv per infus	DANTRIUM Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Il contenuto del flaconcino deve essere protetto dalla luce diretta e impiegato entro 6 ore dalla preparazione. La soluzione non deve essere esposta a temperature inferiori a 15°C e superiori a 25°C.														
	segue																

vedi Tabella Antidoti

